



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

MAPACONCEPTUAL: “TOXOPLASMOSIS”

MVZ: ROBERTO GARCIA SEDANO BARREDA


4TO. CUATRIMESTRE

GRUPO: “A”

NOMBRE DEL ALUMNO: IRVIN PATRICIO
GORDILLO GARCÍA

30/11/2024

TOXOPLASMOsis




¿CÓMO SE CONTAGIA?



- Ingerir carne cruda o poco cocida
- Tocar heces de gato infectado
- Beber agua contaminada
- Utilizar utensilios o tablas de cortar que hayan estado en contacto con carne cruda
- Recibir una transfusión de sangre o un trasplante de órganos infectados

En animales:



¿QUÉ ES?


La toxoplasmosis es una enfermedad infecciosa causada por el parásito *Toxoplasma gondii*. Puede afectar a los ojos, el cerebro, los pulmones, el corazón, el hígado, y otros órganos.



SÍGNOS CLÍNICOS


En humanos:

- Inflamación de los ganglios linfáticos
- Dolor de cabeza
- Fiebre
- Dolor muscular
- Dolor de garganta
- Alteraciones visuales




La toxoplasmosis es especialmente importante en las mujeres embarazadas, ya que puede afectar gravemente al feto y/o a la placenta.

- Perros: La toxoplasmosis generalizada en perros se caracteriza por fiebre, pérdida de peso, anorexia, diarrea, vómitos, convulsiones, ataxia, paresia o parálisis.
- Gatos: Los síntomas de la toxoplasmosis en gatos pueden incluir fiebre, diarrea, tos, dificultad para respirar, apatía, falta de apetito, uveítis, ictericia, mucosidad, depresión y anorexia.
- Ovejas, cabras, cérvidos y cerdos: La toxoplasmosis puede causar abortos y mortinatos.
- Gatitos de pocas semanas: Pueden presentar diarrea.



DIAGNÓSTICO



El diagnóstico de la toxoplasmosis se realiza mediante análisis de sangre que detectan anticuerpos contra el parásito.

PREVENCIÓN

- Lavarse las manos con jabón y agua después de estar en contacto con tierra, arena, carne cruda, o heces de animales
- Cocinar bien la carne y no probarla antes de que esté bien cocida
- Limpiar a diario la bandeja sanitaria de los gatos y lavarse bien las manos después
- Evitar el contacto con los gatos, especialmente si estás embarazada



TRATAMIENTO

La infección por *Toxoplasma gondii* es frecuente en el gato y suele ser asintomática. No obstante, las infecciones agudas o diseminadas pueden afectar a órganos como los ojos, el cerebro u otros sistemas. La clindamicina es el tratamiento de elección.



BIBLIOGRAFIA

- <https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/toxoplasmosis/symptoms-causes/syc-20356249#:~:text=La%20toxoplasmosis%20es%20una%20infecci%C3%B3n,al%20beb%C3%A9%20durante%20el%20embarazo.>
- https://ebusiness.avma.org/files/productdownloads/toxoplasmosis_brochure_spanish.pdf
- <https://www.kivet.com/blog/toxoplasmosis-en-gatos/>
- <https://vtfocus.royalcanin.com/es/cientifico/toxoplasmosis-felina#:~:text=La%20infecci%C3%B3n%20por%20Toxoplasma%20gondii%20es%20frecuente%20en%20el%20gato,es%20el%20tratamiento%20de%20elecci%C3%B3n.>
- [https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/toxoplasmosis/diagnosis-treatment/drc-20356255#:~:text=Pirimetamina%20\(Daraprim\).&text=La%20leucovorina%20c%C3%A1lcica%20ayuda%20a,\)%20y%20azitromicina%20\(Zithromax\).](https://www.mayoclinic.org/es/diseases-conditions/toxoplasmosis/diagnosis-treatment/drc-20356255#:~:text=Pirimetamina%20(Daraprim).&text=La%20leucovorina%20c%C3%A1lcica%20ayuda%20a,)%20y%20azitromicina%20(Zithromax).)