

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

**CUADRO SINOPTICO: "SITIO Y
CARACTERISTICAS DE EYACULACION"**

**MVZ: MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ
FIGUEROA**

4to CUATRIMESTRE

GRUPO: "A"

**NOMBRE DEL ALUMNO: IRVIN PATRICIO
GORDILLO GARCÍA**

21/09/2024

Sitio y características de la eyaculación

Bovino

Sitio: En la vagina o antes del cérvix

Características: Es importante entonces saber que un semen normalmente debe cumplir con un mínimo de parámetros tales como: volumen entre 3 a 15 ml., concentración de 500 a 1500 millones de espermatozoides, color marfil opaco, motilidad mayor al 70% y una morfología normal también mayor al 80%.

Ovino

Sitio: En la vagina o antes del cérvix

Características: El semen del ovino es de color crema pálido o lechoso, el volumen normal de eyaculado de un ovino adulto es de 0.5 mL a 2 mL y en ovinos jóvenes de 0.5 a 0.7mL.

Equino

Sitio: Lo deposita intrauterino

Características: El color del semen de potro normal, varía entre blanco acuoso a blanco cremoso dependiendo de la concentración espermática. El olor es característico para el semen de cada especie y, por tanto, muy difícil de describir; solamente la práctica permite distinguir un olor anormal. El examen por medio de olfacción podría servir para distinguir algunas infecciones.

Porcino

Sitio: Lo deposita intrauterino

Características: La fracción pre-espermática tiene un color muy transparente, la segunda fracción es de color blanquecino lechoso, la tercera es blanquecina transparente y la fracción gelatinosa es blanca grisácea. El eyaculado total generalmente tiene un color blanquecino con variaciones hacia el gris.

Canino

Sitio: Lo deposita intrauterino

Características: La eyaculación del perro es larga (a veces se prolonga durante más de media hora); se realiza gota a gota y en tres fracciones diferentes, fácilmente reconocibles e individualizables: La fracción con acción lubricante, la fracción espermática, la fracción prostática.

Felino

Sitio: En la vagina

Características: La eyaculación de un gato macho dura entre 1 y 30 segundos, después de que el macho toma a la hembra por el cuello y la monta.

BIBLIOGRAFIA

- <https://reproduccionanimalesdomesticos.fmvz.unam.mx/libro/capitulo-21/sitio-de-deposito-de-semen.html#:~:text=En%20rumiantes%2C%20el%20semen%20se,dep%C3%B3sito%20de%20semen%20es%20intrauterino.>
- <https://www.anicura.es/consejos-de-salud/gato/consejos-de-salud/la-reproduccion-de-los-gatos/>
- <https://www.ciap.org.ar/Sitio/Archivos/recoleccion-del-semen-de-cerdo.pdf>
- <https://www.valdelesabeyes.com/articulos/fisiologia-sexual-canina.html#:~:text=La%20eyaculaci%C3%B3n%20del%20perro%20es,luchoso%2C%20que%20contiene%20los%20espermatozoides.>
- <file:///C:/Users/HP%20RED/Downloads/publicador,+Journal+manager,+Archivo+editado.html>
- <https://revistageneticabovina.com/biotecnologia/semen-bovino/>
- https://www.unpa.edu.mx/tesis_Tux/tesis_digitales/maestria_biotecnologia/MB26-Rosal%C3%ADa_Hern%C3%A1ndez_Garc%C3%ADa.pdf