



Afecciones ureterinas (puerperio y lactancia)

GARCÍA GONZÁLEZ VALERIA ANGÉLICA

Alumno

MVZ Domínguez Figueroa María de Lourdes

Docente

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Licenciatura

Fisiología de la reproducción II

Materia

Tapachula, Chiapas a 02 de Noviembre del 2024

Enfermedades después del parto

01

Metritis

Infección microbiana producida en el útero 21 días después del parto. Generalmente presente después de un parto difícil.

Signos clínicos

Secreción vaginal con olor putrefacto, fiebre alta, pérdida de apetito, disminución en la producción láctea, letargo, deshidratación.

Tratamiento

Antibiótico de alto espectro terapéutico, antibióticos con buena llegada al útero. Se puede acompañar con terapia hormonal. En la metritis tóxica utilizar suero y AINES. Infusiones uterinas.

Prevención

Buen manejo en el parto, higiene y limpieza en instalaciones y equipos, buena alimentación, monitorear a bajas recién paridas 3 semanas posteriores al parto.

02

Retención placentaria

Retraso en la expulsión de membranas placentarias dentro de las primeras 12-24 hrs. Generalmente ocurre de 3-8 horas después de lo normal.

Signos Clínicos

Fiebre, depresión, letargo, pérdida de apetito, debilidad, deshidratación, ausencia de movimientos rumiales, pérdida de peso, disminución en la producción láctea, olor fétido de las membranas placentarias.

Tratamiento

Antibioterapia sistémica, solución que contiene clorhidrato de oxitetraciclina. Productos hormonales (oxitocina, prostaglandina).

Prevención

Buena alimentación, reducir el estrés en área de parto, buena vacunación para prevenir enfermedad infecciosas, higiene y limpieza en áreas de parto, seleccionar toros adecuados para las vacas.

03

Mastitis

Inflamación de las glándulas mamarias y tejidos secretores, afectando una o varias ubres de la vaca. Se divide en clínica, subclínica, aguda y crónica.

Signos Clínicos

Mastitis subclínica: no manifiesta signos, solo hay baja del 30% en la producción de leche.

Mastitis clínica: inflamación en la glándula mamaria, enrojecimiento, calor, dolor al palpar, leche coagulada, fiebre, depresión, pérdida de peso, baja producción de leche.

Mastitis aguda: urbe hinchada, rígida, secreción de sangre, dificultad al respirar, taquicardia.

Mastitis crónica: Al ser recurrente en varios meses la leche presenta coágulos muy evidentes, color amarillo y olor feo. pezones pequeños y pérdida de funcionalidad.

Tratamiento

Antibióticos intramamarios, antibióticos sistémicos, suspensión intramamaria en todos los pezones cuando son secadas, antiinflamatorios para mastitis, sacrificios para vacas con mastitis crónica.

Prevención

Monitoreo con palpación de las glándulas mamarias, pruebas frecuentes sobre mastitis, buena higiene al ordeñar, limpieza de instalaciones, buena alimentación.



Fuentes

<https://www2.zoetis.cl/productos-y-soluciones/bovinos/metritis#:~:text=La%20metritis%20es%20una%20inflamaci%C3%B3n,anormal%20o%20una%20retenci%C3%B3n%20placentaria.>

<https://www.clubganadero.com/metritis-en-bovinos/>

<https://www.clubganadero.com/retencion-placentaria/#:~:text=Se%20define%20como%20retenci%C3%B3n%20de,3%20y%208%20horas%20posteriores.>

<https://www.clubganadero.com/mastitis-bovina/>

<https://www.clubganadero.com/medicamentos-para-la-mastitis-bovina/>