



CUADRO SINOPTICO "PRINCIPALES ENFERMEDADES UTERINAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR DURANTE PUERPERIO Y LACTANCIA"

RAMOS OLVERA MONSERRAT

MVZ. Domínguez Figueroa María de Lourdes

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fisiología de la reproducción animal II

Tapachula, Chiapas

02 de noviembre del 2024

Enfermedades uterinas durante el puerperio y lactancia.

METRITIS

Es una inflamación que se produce por la entrada de bacterias después del parto. Es una enfermedad común en vacas, especialmente en las primeras dos semanas después de dar a luz.

Signos clínicos:

- Secreción vaginal mucopurulenta de color amarillento y mal olor.
- Fiebre.
- Depresión, letargo y debilidad.
- Membranas mucosas pálidas.
- Perdida del apetito.
- Disminución de la reproducción de leche.
- Infertilidad.

Tratamiento:

- Prostaglandinas c/14 días a partir de los 30 días después del parto.
- Oxitocina que es el tratamiento hormonal para la metritis postparto.
- Antibióticos no irritantes.
- Gentamicina, que es eficaz frente a más del 90% de los gérmenes frecuentemente implicados en metritis.

Prevención:

- Mantener limpia la zona de maternidad.
- Utilizar que produzcan terneros pequeños.
- Alimentar con antioxidantes, como la vitamina E, el selenio y el betacaroteno.
- Manejar adecuadamente el parto.
- Establecer un programa de vaca fresca con monitoreo diario las primeras 3 semanas posparto.

ENDOMETRITIS

Es una enfermedad inflamatoria del útero en bovinos que puede ser subclínica, es decir, sin síntomas, o clínica. Se caracteriza por la acumulación de pus o células polimorfonucleares en el endometrio.

Signos clínicos:

- Secreción vaginal mucopurulenta de color amarillento y mal olor.
- Fiebre.
- Disminución de apetito.
- Perdida de la producción de leche.
- Placenta retenida.
- infertilidad

Tratamiento:

El tratamiento preventivo y curativo para la endometritis consiste principalmente en:

- Usar prostaglandinas c/14 días desde los 30 días posparto.
- Usar antibióticos no irritantes.
- Combinar un uterotónico y un lavado intrauterino.
- Administrar un antibiótico con amplio espectro terapéutico.

Prevención:

- Brindar comodidad, higiene y nutrición adecuadas durante el periodo de transición.
- Manejar el parto de manera adecuada.
- Establecer un programa de vaca fresca con monitoreo diario las primeras 3 semanas posparto.

METRITIS

Es una infección uterina en vacas que se caracteriza por la acumulación de pus en el útero y la presencia de un cuerpo lúteo persistente. Se produce cuando el cuello uterino se cierra y no permite que el pus drene.

Signos clínicos:

- Interrupción en el ciclo estral, No puede complementar un ciclo.

Tratamiento:

- Administración de PGF2-alfa o sus análogos en dosis luteolíticas normales.
- En aproximadamente el 80% de los casos tratados, se produce la expulsión del exudado y la eliminación de las bacterias del útero.

Prevención:

- Manejo adecuado del parto.
- Higiene y limpieza de las instalaciones.
- Nutrición adecuada.
- Establecer un programa de vaca fresca con monitoreo diario las primeras 3 semanas.

