



**Tarea: CUADRO SINOPTICO**

**AL.O: JARED GONZALEZ NAVARRO**

**M.V.Z. MARIA DE LOURDES DOMINGUEZ FIGUEROA**

**UNIVERSIDAD DEL SURESTE**

**Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia**

**Mat: FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL II**

**Tapachula Chiapas, 1 de Noviembre del 2024**

# ENFERMEDADES UETERINAS



## CETOSIS CLINICA

ES UNA ENFERMEDAD METABOLICA ASOCIADA AL BALANCE ENERGETICO NEGATIVO QUE SUFREN LAS VACAS DEDICADAS A LA PRODUCCION LACTEA AL INICIO DE LA LACTANCIA Y SE CARACTERIZA POR UN AUMENTO EN LA CONCENTRACION DE CUERPOS CETONICOS CIRCULANTES.

### SIGNOS CLINICOS

- Pérdida de peso corporal
- Inapetencia
- Heces secas
- Disminución de la producción de leche

### PREVENCIÓN

Que mantengan un buen consumo de alimento y dietas que provean los nutrientes necesarios durante el periodo seco tardío e inmediatamente después del parto. n

### TRATAMIENTO

- Propilenglicol por vía oral, en dosis de 300 g por vaca cada 24 horas durante 3 días en casos leves, y durante 5 días en casos graves
- Vitamina B12
- Glucosa intravenosa en casos graves
- Incremento del consumo de energía en el alimento



## MASTITIS CLINICA

Es una reacción inflamatoria de origen infeccioso, traumático o tóxico del tejido de la glándula mamaria.

### SIGNOS CLINICOS

- Hinchazón, calor, dureza, enrojecimiento o dolor en la ubre
- Leche con aspecto acuoso, escamas, coágulos o pus
- Disminución notable en la producción de leche
- Aumento de la temperatura rectal

### TRATAMIENTO

- Usar un antibiótico de amplio espectro como la oxitetraciclina
- Administrar dexametasona para disminuir la hinchazón de la glándula mamaria

### PREVENCIÓN

La mastitis clínica en animales se puede prevenir de varias formas, entre ellas: Higiene, Vacunas, Dieta, Control de moscas



## ENDOMETRITIS CLINICA

Es una inflamación de la mucosa uterina que puede afectar a los animales de producción

### SIGNOS CLINICOS

se caracteriza por la presencia de secreción purulenta (>50 % pus) o mucopurulenta (aproximadamente 50 % pus y 50 % moco) en la vagina después de 21 días del parto sin signos sistémicos.

### TRATAMIENTO

Consiste principalmente en el uso de prostaglandinas cada 14 días desde los 30 días posparto, el uso de antibióticos no irritantes es lo ideal.

### PREVENCIÓN

TM realiza Aseo genital externo con agua tibia. - Profesionales realizan lavado de manos clínico previo y posterior al tacto. - Uso de guante estéril en una mano. - Entreabrir labios mayores y menores manteniendo técnica aséptica.

<https://www.google.com/search?>

[sca\\_esv=29cde2af3c8132ef&rlz=1C1CHZN\\_enMX1099MX1099&sxsrf=ADLYWIIJqKwn4eyz1zs6wk3ojsBpTM7MmQ:1730498734410&q=enfermedades+QUE+SE+PUEDEN+PRESENTAR+DURANTE+PUERPERIO+Y+LACTANCIA.+en+veterinaria&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPvcBgWizR0-0aFOH11Sb5tINhdzvguW7TJ8ZJj4v-NOGupFgAvggjQ9SlaQqYsu\\_d0ckleKg--rW8TsOQ1YKYOVmxa7ncRe9blo\\_5kwjvs\\_ikSaeExa8\\_80IM8naLO\\_7uWlpHH4ml7rg5OENY7tCmdwo8Sw9JRMGOTvPQAv0dyEhLSRu-UPoRIGcZnvpusRwDKx3MRbq8zw&sa=X&ved=2ahUKEwie9eSSkryJAxXpjUQIHe5QOcgQ0pQJegQIDhAB&biw=1536&bih=730&dpr=1.25](https://www.google.com/search?sca_esv=29cde2af3c8132ef&rlz=1C1CHZN_enMX1099MX1099&sxsrf=ADLYWIIJqKwn4eyz1zs6wk3ojsBpTM7MmQ:1730498734410&q=enfermedades+QUE+SE+PUEDEN+PRESENTAR+DURANTE+PUERPERIO+Y+LACTANCIA.+en+veterinaria&source=lnms&fbs=AEQNm0CbCVgAZ5mWEJDg6aoPvcBgWizR0-0aFOH11Sb5tINhdzvguW7TJ8ZJj4v-NOGupFgAvggjQ9SlaQqYsu_d0ckleKg--rW8TsOQ1YKYOVmxa7ncRe9blo_5kwjvs_ikSaeExa8_80IM8naLO_7uWlpHH4ml7rg5OENY7tCmdwo8Sw9JRMGOTvPQAv0dyEhLSRu-UPoRIGcZnvpusRwDKx3MRbq8zw&sa=X&ved=2ahUKEwie9eSSkryJAxXpjUQIHe5QOcgQ0pQJegQIDhAB&biw=1536&bih=730&dpr=1.25)

<https://www.google.com/search?>

[q=prevencion+endometritis+clinica+veterinaria&sca\\_esv=29cde2af3c8132ef&rlz=1C1CHZN\\_enMX1099MX1099&sxsrf=ADLYWIJ0B8egk91IYvUqfKPvP0492hKx5Q%3A1730504538357&ei=WmclZ-bFFZDjkPIP5f22gQ0&ved=0ahUKEwjm2qnip7yJAxWQJEQIHeW-LdAQ4dUDCBA&uact=5&oq=prevencion+endometritis+clinica+veterinaria&gs\\_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiK3ByZXZlbnNpb24gZW5kb21ldHJpdGlzIGNsaW5pY2EgdmV0ZXJpbmFyaWEyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABiiBEiiTFD7BFiSR3AAeAKQAQCYAdICoAGnGaoBBzAuNy42LjK4AQPIAQD4AQGYAgmgAsoOwglIEEAAYR8ICBxAjGLACGCeYAwDiAwUSATEgQlgGAZAGCJIHBzEuNC4yLjKgB5gy&sclient=gws-wiz-serp](https://www.google.com/search?q=prevencion+endometritis+clinica+veterinaria&sca_esv=29cde2af3c8132ef&rlz=1C1CHZN_enMX1099MX1099&sxsrf=ADLYWIJ0B8egk91IYvUqfKPvP0492hKx5Q%3A1730504538357&ei=WmclZ-bFFZDjkPIP5f22gQ0&ved=0ahUKEwjm2qnip7yJAxWQJEQIHeW-LdAQ4dUDCBA&uact=5&oq=prevencion+endometritis+clinica+veterinaria&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiK3ByZXZlbnNpb24gZW5kb21ldHJpdGlzIGNsaW5pY2EgdmV0ZXJpbmFyaWEyCBAAGIAEGKIEMggQABiABBiiBDIIEAAYgAQYogQyCBAAGIAEGKIEMggQABiABiiBEiiTFD7BFiSR3AAeAKQAQCYAdICoAGnGaoBBzAuNy42LjK4AQPIAQD4AQGYAgmgAsoOwglIEEAAYR8ICBxAjGLACGCeYAwDiAwUSATEgQlgGAZAGCJIHBzEuNC4yLjKgB5gy&sclient=gws-wiz-serp)