

**CUADRO SINÓPTICO: “PRINCIPALES ENFERMEDADES UTERINAS
DURANTE EL PUERPERIO Y LACTANCIA.”**

Alumno: Gallardo Tejeda Frida Clarisa

Profesor: M.V.Z. Domínguez Figueroa María de Lourdes

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

Fisiología de la Reproducción Animal II

Tapachula, Chiapas

02 de noviembre del 2024

PRINCIPALES ENFERMEDADES UTERINAS DURANTE EL PUERPERIO Y LACTANCIA

- **Metritis.**
 - ¿Qué es? ◦ Inflamación del útero, normalmente debida a una infección microbiana en el postparto.
 - Signos clínicos. ◦ Secreción vaginal mucopurulenta de color amarillento y con mal olor.
◦ Depresión, letargo y debilidad.
◦ Membranas mucosas
◦ Fiebre.
◦ Disminución de la producción de leche.
 - Tratamiento. ◦ Administrar Cobactan. una solución inyectable que contiene cefquinome, un antibiótico con amplio espectro terapéutico.
 - Prevención. ◦ Nutrición adecuada.
◦ Manejo adecuado del parto.
◦ Higiene y limpieza de las instalaciones.
- **Endometritis.**
 - ¿Qué es? ◦ Es una inflamación o irritación del revestimiento del útero (el endometrio).
 - Signos clínicos. ◦ Dolor abdominal.
◦ Pérdida de apetito.
◦ Flujo vaginal anormal.
◦ Fiebre.
 - Tratamiento. ◦ Uso de prostaglandinas cada 14 días desde los 30 días posparto, el uso de antibióticos no irritantes es lo ideal.
 - Prevención. ◦ Buen manejo del parto.
◦ Higiene y saneamiento.
◦ Revisión veterinaria.
- **Piometra.**
 - ¿Qué es? ◦ Es una enfermedad infecciosa producida por bacterias que se caracteriza por la presencia de pus dentro del útero. Afecta a perras y gatas de edad generalmente avanzada.
 - Signos clínicos. ◦ Fiebre.
◦ Flujo vaginal maloliente.
◦ Pérdida de apetito.
◦ Polidipsia y poliuria.
 - Tratamiento. ◦ Procedimiento quirúrgico, que consiste en la castración del animal.
 - Prevención. ◦ Castración prematura.
- **Retención placentaria.**
 - ¿Qué es? ◦ Falta de expulsión de la placenta dentro de las 12 a 24 horas después del parto.
◦ Ocurre en bovinos.
 - Signos clínicos. ◦ Debilidad y letargo.
◦ Deshidratación.
◦ Ausencia de movimientos ruminales
◦ Olor fétido.
 - Tratamiento. ◦ Evitar extraer la placenta ya que puede generar traumatismos, hemorragias o infecciones en el útero. Se recomienda recortar con cuidado el exceso de tejido que sobresale.
 - Prevención. ◦ Nutrición adecuada.
◦ Una sola aplicación de oxitocina inmediatamente después del parto.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://rumiantes.com/tratamiento-metritis-eficaz-periodo-supresion/#:~:text=La%20metritis%20es%20la%20inflamaci%C3%B3n,la%20multiplicaci%C3%B3n%20de%20las%20bacterias.>
- <https://www.clubganadero.com/metritis-en-bovinos/>
- <https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001484.htm>
- <https://mx.virbac.com/home/enfermedades/endometritis.html#:~:text=Prevenci%C3%B3n%20%2F%20Curaci%C3%B3n,no%20irritantes%20es%20lo%20ideal.>
- <https://www.anicura.es/consejos-de-salud/perro/consejos-de-salud/piometra-que-es-sintomas-y-tratamiento/>