



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

REPRODUCCION ANIMAL

MVZ.MARIA DE LOURDES DOMÍNGUEZ FIGUEROA


**CUADRO SINOPTICO SOBRE LAS PRINCIPALES
ENFERMEDADES UTERINAS**

4ER CUATRIMESTRE

GRUPO: A

**NOMBRE DEL ALUMNO: JOSE JULIAN HERNANDEZ
SOLORIO**

02/011/2024



ENFERMEDADES UTERINAS



endometritis posparto

infección uterina que se produce después del parto y que suele ser causada por bacterias que ascienden desde el tracto genital inferior o gastrointestinal

SIGNOS CLINICOS

- Dolor en el bajo vientre
- Fiebre y escalofríos
- Sensación de malestar general
- Secreción vaginal maloliente
- Palidez
- Cefalea

TRATAMIENTO

clindamicina 900 mg IV cada 8 h más gentamicina 1,5 mg/kg IV cada 8 h o 5 mg/kg 1 vez al día (1); se agrega 1 g cada 6 h si se sospecha una infección por enterococos o si no se produce una mejoría dentro de las 48 h.

PREVENCION

TM realiza Aseo genital externo con agua tibia. – Profesionales realizan lavado de manos clínico previo y posterior al tacto. – Uso de guante estéril en una mano. – Entreabrir labios mayores y menores manteniendo técnica aséptica.

Metritis

inflamación del útero en animales que se produce por una infección microbiana. Puede afectar a diferentes especies animales, como vacas, conejos y otros pequeños animales

SIGNOS CLINICOS

- Secreción vaginal mucopurulenta de color amarillento y con mal olor.
- Fiebre.
- Depresión, letargo y debilidad.
- Membranas mucosas pálidas.
- Pérdida del apetito.

TRATAMIENTO

consiste principalmente en el uso de prostaglandinas cada 14 días desde los 30 días posparto, el uso de antibióticos no irritantes es lo ideal.

PREVENCION

1. Buena alimentación.
2. Salas de parto limpias y secas.
3. Higiene adecuada en la asistencia a los partos difíciles.
4. Asegurar un ambiente limpio, cómodo, tranquilo y espacioso para el parto.
5. Garantizar una nutrición adecuada y un ambiente sin estrés.

Retención de Restos Placentarios

Ocurre cuando fragmentos de la placenta permanecen en el útero tras el parto, lo que puede interferir en la contracción uterina normal y aumentar el riesgo de hemorragia e infección.

SIGNOS CLINICOS

- Sangrado vaginal persistente o recurrente
- Loquios anormales o con mal olor.
- Dolor pélvico o sensación de presión en el bajo vientre.

TRATAMIENTO

- egrado uterino : Procedimiento para eliminar los restos placentarios.
- Antibióticos : En caso de sospecha de infección.
- Oxitocina : Para ayudar al útero a expulsar el contenido retenido.

PREVENCION

- Revisar cuidadosamente la placenta después del parto.
- Ecografía si se sospecha de retención de restos.
- Monitoreo cuidadoso durante el puerperio para detectar signos tempranos.

BIOGRAFIA

<https://www.iefertilidad.com/blog/diagnostico-y-tratamiento-de-las-enfermedades-uterinas/>

<https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/cuidados-posparto/infecciones-uterinas-despu%C3%A9s-del-parto>

<https://www.tauli.cat/es/hospital/neixeralparctauli/postpart/recomanacions-compliacions-durant-puerperi>