



## MAPA CONCEPTUAL "ANTIHIISTAMINICOS I"

Reyna González José Ernesto

MVZ Arreola Rodriguez Ety Josefina

Farmacología II

Cuarto grado grupo B

Medicina Veterinaria y Zootecnia

Universidad del Sureste

Tapachula, Chis. A 21 Septiembre de 2024

# ANTIHIISTAMINICOS I

Fármacos empleados en el tratamiento de enfermedades alérgicas, inhiben los efectos de la histamina.

## FARMACOCINETICA

Inician acción entre 15 a 30 minutos y es máxima 1 a 2 horas. Duración de 4 a 6 horas, pequeñas cantidades se pueden excretar por leche.

Penetran bien el SNC y son pocos selectivos en sus acciones.

## EFFECTOS ADVERSOS

- Sedación.
- Somnolencia.
- Aumento del apetito.
- Efectos anticolinérgicos (sequedad de boca, visión borrosa, estreñimiento, retención de orina).

Algunos de estos:

Tripelenamina

Difenhidramina

## USO

- Rinoconjuntivitis alérgica.
- Urticarias.
- Control del picor.
- Tos catarral.
- Náuseas.
- Tx y prevención del mareo.
- Insomnio.

Hidroxicina

Clorfeniramina

