



Super nota
Toxoplasmosis

Tamayo Santos Iranis

Méd. García Sedano barrera
Roberto

Zoonosis y salud pública
veterinaria

Universidad del sureste Medicina
veterinaria y zootecnia

Tapachula, chis. 30.Nov. 2024

TOXOPLASMOSIS

LA TOXOPLASMOSIS EN ANIMALES ES UNA ENFERMEDAD PARASITARIA CAUSADA POR EL PARÁSITO TOXOPLASMA GONDII

SÍNTOMAS

Los síntomas de la toxoplasmosis en animales pueden variar dependiendo de la especie y la gravedad de la infección. Algunos síntomas comunes incluyen:

1. Fiebre
2. Pérdida de apetito
3. Diarrea
4. Vómitos
5. Dolor abdominal
6. Respiración dificultosa
7. Parálisis



TRANSMISIÓN

1. Ingestión de ooquistas: Los ooquistas son las formas inmaduras del parásito que se encuentran en las heces de los gatos.
2. Ingestión de carne cruda o poco cocida: La carne cruda o poco cocida infectada con el parásito puede transmitir la enfermedad.
3. Contacto con superficies contaminadas



DIAGNÓSTICO

1. Pruebas de sangre: Para detectar anticuerpos contra Toxoplasma gondii.
2. Pruebas de orina: Para detectar el parásito en la orina.
3. Biopsia: Para examinar tejidos infectados.



TRATAMIENTO

- Spiramicina
 - Pirimetamina
 - Sulfadiazina
- antibióticos que se utilizan para tratar la toxoplasmosis en animales.



PREVENCIÓN

1. Mantener los gatos alejados de las áreas de preparación de alimentos.
2. Cocinar la carne hasta que esté bien cocida.
3. Evitar el contacto con superficies contaminadas.
4. Lavar las manos después de manipular carne cruda o poco cocida.
5. Mantener los animales en un entorno limpio y libre de parásitos.

EN HUMANOS

CAUSAS Y TRANSMISIÓN

- Causada por el parásito Toxoplasma gondii
- Transmisión a través de:
 - Ingestión de ooquistas en heces de gato
 - Ingestión de carne cruda o poco cocida infectada
 - Transmisión vertical de madre a hijo durante el embarazo




SÍNTOMAS

- Fiebre
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Fatiga
- Pérdida de apetito
- Diarrea
- Vómitos



GRUPOS DE RIESGO

- Mujeres embarazadas
- Personas con sistemas inmunológicos debilitados (VIH/SIDA, quimioterapia, etc.)
- Personas que manipulan carne cruda o poco cocida



DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

- Pruebas de sangre para detectar anticuerpos
- Pruebas de orina para detectar el parásito
- Tratamiento con medicamentos como spiramicina, pirimetamina y sulfadiazina

PREVENCIÓN

- Cocinar la carne hasta que esté bien cocida
- Evitar el contacto con heces de gato
- Lavar las manos después de manipular carne cruda o poco cocida
- Mantener los gatos alejados de las áreas de preparación de alimentos

Bibliografía

<https://biblat.unam.mx/hevila/Revista-de-enfermedades-infecciosas-en-pediatría/2019/vol31/no128/5.pdf>

<https://gaceta.facmed.unam.mx/index.php/2024/11/22/partos-prematuros-debidos-a-la-infeccion-por-toxoplasma-gondii/>

https://repositorio.unam.mx/contenidos/ficha/toxoplasmosis-como-un-problema-de-salud-publica-3452316?c=r16vWI&d=true&q=*&i=1&v=1&t=search_0&as=0