



Roblero Hernandez Ericka Janeth

**M.V.Z BARREDA ROBERTO
GARCIA SEDANO**

Universidad del Sureste

Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia

ZOONOSIS Y SALUD PUBLICA VETERINARIA

Tapachula Chiapas

30/11/24

<https://www.dodot.es/embarazo/embarazo-saludable/articulo/toxoplasmosis-en-el-embarazo>

TOXOPLASMOSIS

Enfermedad infecciosa causada por un parásito llamado *Toxoplasma gondii*. Aunque puede infectar a una amplia variedad de animales de sangre caliente, incluyendo aves y mamíferos, los gatos son los huéspedes definitivos del parásito.

COMO SE CONTAGIA

Consumo de carne cruda o poco cocida: Especialmente de cerdo, cordero y venado, que pueden contener quistes del parásito.



Contacto con heces de gato infectado: Las heces de gato contienen ooquistes del parásito, que pueden sobrevivir en el medio ambiente durante meses.

SIGNOS CLINICOS

ANIMALES

En gatos, la infección puede causar fiebre, pérdida de apetito y ganglios linfáticos inflamados.

En otros animales, como ovejas y cerdos, la infección puede causar abortos o el nacimiento de crías débiles.

DIAGNOSTICO

Análisis de sangre: Se buscan anticuerpos contra el parásito.

Examen de líquido cefalorraquídeo: En casos de sospecha de infección del sistema nervioso central.

HUMANOS

La mayoría de las personas infectadas no presentan síntomas o estos son muy leves, similar a una gripe.

En el feto, la infección puede causar aborto espontáneo, muerte fetal o defectos congénitos.

PREVENCION

- Cocinar bien la carne: Asegurarse de que la carne esté bien cocida antes de consumirla.
- Lavarse las manos
- Evitar el contacto con heces de gato: Usar guantes al cambiar la arena del gato y evitar que los niños pequeños entren en contacto con las heces