



Universidad Del Sureste

Nombre del Alumno:
Richard Jared Cruz Ochoa

Nombre del Docente:
M.V.Z
MARIA DE LOURDES
DOMÍNGUEZ FIGUEROA

Materia:
FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL II

Fecha de entrega:
29/10/24

Medicina Veterinaria y Zootecnia

bibliografia:
file:///C:/Users/FamQuin/Downloads/UNIDAD%203%20COMPLETA%20PUERPERIO
%20Y%20LACTACION.pdf

ENFERMEDADES UTERINAS

METRITIS

La metritis es una infección del útero causada por bacterias que pueden ingresar durante o después del parto.

SIGNOS CLINICOS

- Descarga vaginal purulenta y fétida.
- Fiebre y depresión.
- Inapetencia y reducción en la producción de leche.
- Dolor abdominal y signos de malestar general

TRATAMIENTO

- Administración de Antibióticos : Antibióticos de amplio espectro para tratar la infección bacteriana.
- Uso de Uterotónicos : Medicamentos que estimulan las contracciones uterinas para ayudar a expulsar el material infeccioso.
- Manejo Higiénico : Mantenga limpio el área alrededor de la vaca y asegúrese de que no haya contaminación que pueda exacerbar la infección

PREVENCION

- Cuidados Postparto : Observar a la vaca después del parto para detectar cualquier signo de infección.
- Higiene : Mantenga limpias las instalaciones y el área alrededor de la vaca para prevenir infecciones.
- Alimentación Adecuada : Proporcionar una dieta rica en nutrientes para favorecer la salud general y la función uterina.

R.PLACENTARIA

La retención placentaria es una complicación del parto caracterizada por la no expulsión de la placenta dentro de las 12 horas posteriores al parto.

SIGNOS CLINICOS

- La placenta permanece en el útero más allá del tiempo normal.
- Puede haber sangrado vaginal o descarga mucosa.
- La vaca puede mostrar signos de dolor, inapetencia y depresión.
- Aumento del riesgo de infecciones uterinas como metritis y endometritis

TRATAMIENTO

- Administración de Oxitocina : Esta hormona estimula las contracciones uterinas para ayudar a expulsar la placenta.
- Administración de Antibióticos : Si se sospecha una infección, se pueden administrar antibióticos de amplio espectro.
- Manejo Higiénico : Mantenga limpio el área alrededor de la vaca y asegúrese de que no haya contaminación que pueda exacerbar la infección

ENDOMETRITIS

La endometritis es la inflamación del endometrio, la capa interna del útero, generalmente causada por infecciones bacterianas.

SIGNOS CLINICOS

- Uso Apropiado del Poder : El uso apropiado del poder es crucial para mantener la motivación y la lealtad del equipo. El abuso del poder de castigo, por ejemplo, puede llevar a la desmotivación y el descontento.

TRATAMIENTO

- Administración de Antibióticos : Antibióticos de amplio espectro para tratar la infección bacteriana.
- Uso de Uterotónicos : Medicamentos que estimulan las contracciones uterinas para ayudar a expulsar el material infeccioso
- Manejo Higiénico : Mantenga limpio el área alrededor de la vaca y asegúrese de que no haya contaminación que pueda exacerbar la infección

PREVENCION

- Cuidados Postparto : Observar a la vaca después del parto para detectar cualquier signo de infección.
- Higiene : Mantenga limpias las instalaciones y el área alrededor de la vaca para prevenir infecciones.
- Alimentación Adecuada : Proporcionar una dieta rica en nutrientes para favorecer la salud general y la función uterina.
- Monitoreo Regular : Revisar regularmente a las vacas para detectar cualquier signo de enfermedad y tratarla tempranamente