

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

**SUPER NOTA. VACUNACIÓN DE PERROS Y
GATOS**

MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA

VICTOR HUGO BALBOA CASTILLO

26 de noviembre de 2024

VACUNAS PARA PERROS



¿QUÉ ES?

Las vacunas para perros son inyecciones que contienen una versión debilitada o muerta de un virus o bacteria, y ayudan a proteger a tu mascota de enfermedades graves.

El calendario de vacunación de los perros suele comenzar a las 6-8 semanas de edad. Las vacunas obligatorias son las que protegen contra el virus del moquillo canino, parvovirus y rabia.

PRIMERA VACUNA

Para la vacunación de perros sanos a partir de 6 semanas de edad o mayores como auxiliar para prevenir la enfermedad causada por el virus del Moquillo Canino (CD), el Adenovirus Tipo 1 (CAV), el Adenovirus Tipo 2 (CAV-2), el virus de la Parainfluenza (CPI), el virus del Coronavirus (CCV) y el Parvovirus (CPV y CPV-2c).

VANGUARD® PLUS 5/CV



VANGUARD PLUS 5/L4



SEGUNDA VACUNA Y REFUERZO

Se aplica 15 días después de la primera vacuna y pasando los 15 días se aplica el refuerzo.

Vacuna preventiva del Distemper canino, Hepatitis infecciosa canina, Enfermedad respiratoria producida por Adenovirus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus, Coronavirosis y Leptospirosis de los caninos.

Vanguard 5 L4/Cv pertenece a una nueva generación de vacunas, que brinda la más completa protección contra las enfermedades más comunes de los caninos.

TERCERA VACUNA

15 días después del refuerzo de la polivalente se aplica la **Bronchicine® CAe**. Esta es un extracto antigénico sin adyuvante obtenido a partir de células de Bordetella bronchiseptica, que se recomienda para la prevención y control de la **Traqueobronquitis Infecciosa Canina** (tos de las perreras) causada por el microorganismo mencionado.

El efecto de persistencia de los anticuerpos maternos de B. bronchiseptica, sobre la respuesta inmune en los cachorros no han sido determinado en esta bacteria.

Cachorros de madres inmunes al organismo usualmente manifiestan títulos bajos de anticuerpos que se disipan a las 4 o 6 semanas de edad.

BRONCHICINE® CAE



DEFENSOR® 1



CUARTA VACUNA

Defensor® 1 es para la vacunación de perros y gatos sanos de 3 meses de edad o mayores, como una ayuda en la prevención de la rabia. La vacuna se prepara a partir de virus rábico químicamente inactivado producido en cultivos celulares.

La semilla viral es una cepa viral fija, altamente inmunogénica, originaria del aislado original de Louis Pasteur en 1882. El virus inactivado es formulado con adyuvante altamente purificado y es empacado en forma líquida

VACUNA ANUAL

NOBIVAC DHPPI + RL, Vacuna Sextuple de Zoetis indicada para Perros, Biológico para Inmunización temprana en cachorros, contra Parvovirus Canino y Distemper canino Combinada y liofilizada contra: Distemper canino (Moquillo), Parvovirus, Adenovirus tipo 2 (CAV 2), causante de la Hepatitis Infecciosa Canina, virus de la Parai. Vacuna Inactivada para Inmunización contra Leptospira. Esta se vuelve a aplicar 1 vez cada año consecutivamente.

NOBIVAC DHPPI + RL - MSD



BIBLIOGRAFÍA

• <https://www2.zoetis.es/productos-y-soluciones/perros/vacunacion-en-perros>

VACUNACIÓN EN GATOS

¿Qué es?

La vacunación de gatos es una herramienta fundamental para mantener su salud. Las vacunas necesarias pueden variar según el estilo de vida y la ubicación del gato, pero hay algunas básicas que se recomiendan.



VACUNA	EDAD PREFERENTE
Desparasitación	6 semanas
Vacuna Triple Felina	8 semanas
Refuerzo Triple Felina	10 semanas
Estudios para vacuna Leucemia	12 semanas
Vacuna Antirrábica	14 semanas

1. TRIPLE FELINA Y REFUERZO

Felocell® 3



Se recomienda vacunar a las 8 semanas de edad y a los 15 días el refuerzo de la misma. Felocell® 3 es para la vacunación de gatos sanos como una ayuda en la prevención de la Rinotraqueitis Viral Felina (FVR) causada por el virus Herpes Felino - 1, la enfermedad respiratoria causada por el Calicivirus Felino (FCV) y la Panleucopenia Felina (FPL) causada por el Parvovirus Felino (FPV), Felocell® 3 contiene cepas atenuadas del virus de la Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia Felina (cepas de Leopardo Johnson Snow), propagados en líneas celulares establecidas.

2. LEUCEMIA FELINA

Se aplica 15 días después del refuerzo de la Triple Felina. Nobivac® Feline 2-FeLV contiene cultivos de tejido, derivados del virus de Leucemia Felina, subgrupos A y B. Para la inmunización de gatos sanos como auxiliar en la prevención de tumores linfoides y enfermedades asociadas con la infección causada por el virus de Leucemia Felina. La vacunación con este producto previene la viremia persistente en gatos expuestos al virus de Leucemia Felina.

Nobivac® Feline 2-FeLV



DEFENSOR® 1



3. RABIA

Defensor® 1 es para la vacunación de perros y gatos sanos de 3 meses de edad o mayores, como una ayuda en la prevención de la rabia. La vacuna se prepara a partir de virus rábico químicamente inactivado producido en cultivos celulares.

BIBLIOGRAFÍA

- https://www.tiendanimal.es/articulos/vacunas-para-gatos-cuales-y-cuando-ponerlas/?srsrtid=AfmBOor6b8p3Y6HiNqPFQ5xkbp9MCj_-QYXnyuH5UZ4akOcv7QRUSyqD