


**SÉPTIMO CUATRIMESTRE**  
**Zootecnia De Pequeñas Especies**

**Super Nota**  
**sobre**  
**“Calendario de**  
**vacunación en**  
**pequeñas especies”**

**M.V.Z.: GARCÍA SEDANO BARREDA ROBERTO**  
**E.M.V.Z.: BRAYAN FABIAN BARRIOS GUZMÁN**

**30 DE NOVIEMBRE DE 2024**



## MONOVALENTE

1ª suelen tener mayor carga antigénica. Se aplica entre las 6-8 semanas de edad del cachorro, una vez ya ha perdido la protección de los anticuerpos maternos.



## POLIVALENTE CANINA

2ª Vacuna polivalente canina, se administra entre las 9-11 semanas de edad. Protege frente a Moquillo, Parvovirus, Hepatitis, Leptospirosis y Parainfluenza.



## POLIVALENTE 2º DOSIS

3ª vacuna: repetiremos la dosis anterior de vacuna polivalente entre las 12-14 semanas de edad del animal.




## ANTIRRÁBICA

4ª vacuna: vacuna de la rabia, a partir de las 12-16 semanas de vida en aquellas comunidades en las que sea obligatorio. Tras ello, deberá realizarse una revacunación anual o bianual, según la CCAA.

## POLIVALENTE 3º DOSIS

5ª vacuna: 3ª revacunación de vacuna polivalente a las 16 semanas de vida. Tras ello, deberá realizarse una revacunación anual.



# VACUNACIÓN FELINA

## 1ª DOSIS DE TRIVALENTE FELINA

En gatos no solemos tener tanto riesgo sanitario, ya que la mayoría de la población felina doméstica es indoor, no sale de casa ni está en contacto con otros individuos de su especie por lo que podríamos empezar el protocolo vacunal a las 8 semanas de edad.



## 2ª DOSIS DE TRIVALENTE FELINA:

Repetiremos con una trivalente a las 3-4 semanas posteriores. Al igual que el caso de los perros, si ponemos la siguiente dosis transcurridos más 30 días deberemos empezar de nuevo con el protocolo vacunal, no debemos adelantar la aplicación por encima de los 15 días.



## VACUNA ANTIRRÁBICA

La aplicación de esta vacuna en las comunidades donde no es obligatoria se recomienda esperar a los 6 meses de edad.



## LEUCEMIA FELINA

Debemos hacer siempre test rápido, a partir de los 4 meses para evitar interferencia con anticuerpos maternos. Los pacientes positivos no se podrán vacunar, en caso de negatividad se podrá aplicar y para ello serán necesarias dos dosis separadas 21 días. Altamente recomendada en gatos outdoor, en gatos indoor no es tan necesaria, pero nosotros mismos podríamos traer sustancias contaminantes en nuestros zapatos, ropa, etc.



# BIBLIOGRAFÍA

[https://www.kivet.com/blog/  
calendario-vacunas-gato/](https://www.kivet.com/blog/calendario-vacunas-gato/)  
[https://www.kivet.com/blog/  
calendario-vacunas-perro/](https://www.kivet.com/blog/calendario-vacunas-perro/)