

**MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA**

**ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES**

**SUPER NOTA. VACUNACIÓN DE PERROS Y  
GATOS**

MVZ. ROBERTO SEDANO BARREDA

CHRISTIAN VALERIA FIGUEROA VICTORIA

26 de noviembre de 2024

- **Vanguard Plus 5 / L4 / cv**

Vacuna preventiva del Distemper canino, Hepatitis infecciosa canina, Enfermedad respiratoria producida por Adenovirus tipo 2, Parainfluenza, Parvovirus, Coronaviriosis y Leptospirosis de los caninos. El programa de vacunación sugerido debe seguir 2 semanas después, repitiendo la dosis nuevamente a las 2 semanas.

- **Vanguard® Plus 5/CV**

Vacuna contra Distemper canino, Adenovirus tipo 2, Coronavirus, Parainfluenza, Parvovirus

- Los perros sanos de 6 semanas de edad, deberán recibir 2 dosis administradas con 2 semanas de separación.
- Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis



- **Bronchicine® CAE**

Bacterina líquida para la prevención de la Traqueobronquitis Infecciosa Canina cachorros a partir de las 8 semanas de edad.

Debe aplicarse una segunda dosis 2 semanas después. Se recomienda la revacunación anual.



- **Defensor® 1**

Vacuna contra la rabia

Perros y gatos sanos deben recibir una dosis única a partir de los 3 meses de edad. Una segunda dosis se debe administrar un año más tarde. Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una dosis.



# Vacunas para



Y



- **Felocell® 3**

## 1 era vacuna

Vacuna contra Rinotraqueitis, Calicivirus y Panleucopenia felina.

Los gatos sanos de 12 semanas de edad deben recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 2 semanas.

Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis

## 2da vacuna

- **Leukocell® 2**

Vacuna contra la Leucemia Viral Felina

Los gatos sanos de 9 semanas de edad o más deben recibir 2 dosis administradas con un intervalo de 3 a 4 semanas.

**Revacunación:** Se recomienda la revacunación anual con una sola dosis.



## 3ra vacuna

- **Defensor® 1**

Vacuna contra la rabia

Perros y gatos sanos deben recibir una dosis única a partir de los 3 meses de edad. Una segunda dosis se debe administrar un año más tarde.

Revacunación: Se recomienda la revacunación anual con una dosis.



# Bibliografía

<https://www2.zoetis.mx/>