

MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MATERIA: ZOOTECNIA DE CONEJOS.

MEDICO: ETI JOSEFINA ARREOLA RODRIGUEZ.

SEPTIMO CUATRIMESTRE.

ESTUDIANTE: MENDEZ ABARCA SAYURI YAMILET.

MANEJO EN CONEJOS

MANEJO

Es el sistema integral de alojamiento y asistencia que permite a los animales crecer, desarrollarse, madurar, reproducirse y comportarse de manera normal, así como mantenerse saludables y en óptimo estado físico.

- 1-Sujecion del animal de la grupa y utilizando la porción caudal del ijar.
- 2-Sujecion del conejo mediante la piel del dorso, a la altura de la espalda.
- 3- Sujecion del conejo por de la peil del dorso, apoyando el cuerpo en la otra mano

- 4-Sujecion a dos manos, utilizando la piel del dorso
- 5-Sujecion por medio de la oreja.
- 6-Sujecion para el traslado, apoyando al conejo sobre el antebrazo.
- 7-Sujecion apoyando al conejo en partes

TRANSPORTE

Todo sistema de transporte de animales debe ser eficiente, cómodo y seguro, sin importar la magnitud del desplazamiento. Deben tomarse las siguientes precauciones:

El desplazamiento en automóvil deberá efectuarse en horarios que permitan condiciones climáticas agradables: ni con mucho frío, ni con mucho calor, ni con mucho sol. •Una vez que los conejos lleguen a su destino y se empien a acomodar en sus nuevas jaulas hay que dejar que los animales descansen y 30 minutos o una hora después se les proporcione un poco de agua; 3 o 4 horas después ya se les podrá ofrecer alimento sólido.

METODOS DE IDENTIFICACION

METODO DE IDENTIFICACION INDIVIDUAL:
Son aquellos que se utilizan para diferenciar a los animales en grandes grupos.

METODO DE IDENTIFICACION TEMPORAL:
Es aquel que consiste en la aplicación de tintas o pinturas atóxicas directamente sobre la piel del animal.

METODO PERMANENTE:
En conejos reproductores, el método permanente de identificación más recomendable y más frecuentemente utilizado es el tatuaje.

Primero deberá inmovilizarse al conejo mediante el contenedor; después deberá limpiarse la superficie interna del pabellón auricular con una torunda empapada previamente de alcohol, para, de esta manera, remover los microorganismos presentes en la superficie, que pudieran provocar infecciones posteriores.

SEXADO

En caso de que el gazapo, sea hembra, se hagan evidentes los labios de la vulva, hiperémicos por ciento, debido a la presión ejercida.

En caso de ser macho, se exteriorizará el prepucio a manera de bulbo o de "cornetilla", pues a la edad del destete el conejo aún no desenvaina el pene.

DESTETE

Lo más recomendable es destetar a los gazapos entre las 5 y las 6 semanas de edad. Los gazapos comienzan a ingerir alimento sólido aproximadamente a las 3 semanas de edad.

PERSERVACION DE LAS PIELS

- 1-DESCARNADO.
- 2- LAVADO.
- 3- ESCURRIDO.
- 4- SECADO.
- 5-ALMACENAMIENTO TEMPORAL.