

Nombre: Eduardo Avendaño Moreno

Asignatura: Zootecnia de conejos

Tema: Reproducción en cunicultura

Docente: Ety Arreola Rodríguez

Cuatrimestre: 7to Cuatrimestre

Ciclo estral

Presenta un ciclo estral de 16 a 17 días. En 13 de estos días puede que existe una fase de anestro que oscila entre 46 y 48 horas, durante las cuales rechaza al macho. El celo se presenta cada 14 a 15 días.

Tipos de ciclo

Precoz: 1-4 días
Normal: 7-14 días
Tardío: mas de 14 días

Proceso administrativo

Pubertad y Madurez sexual

La pubertad corresponde al primer celo de la hembra, a los cuatro y cinco meses, cuando ha madurado el proceso fisiológico reproductivo y se mantiene la ciclicidad de los procesos sexuales.

Razas pequeñas: 2 y 3 meses de edad
Razas medianas: 3 y 4 meses de edad

Parto

Este proceso puede extenderse entre 4 y 5 horas. Por lo general la coneja se encargará de limpiar y acomodar a las crías por si misma. Las camadas de conejos pueden variar oscilando entre 4 y 10 gazapos.

Apareamiento y Fecundación

El macho deposita el espermatozoides en la parte superior de la vagina de la hembra. La fecundación se da en el útero aprox 14 horas después de la monta. La ovulación ocurre de forma natural, 10 a 13 hrs después del apareamiento.

Vulva roja brillante: acepto de la monta un 85%.
Morada violeta: 60% de la monta.
Rosada: 30% de aceptación.
Blanquecina: la hembra no aceptara la monta.

Referencias

[CICLO ESTRAL DE LA CONEJA - TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN DE CONEJOS PARA CARNE URUGUAY INSTITUTO NA](#)

[Cunicultura: CICLO DE LA REPRODUCCIÓN](#)