

INFOGRAFIA: PERIODOS DEL TRABAJO DEL PARTO

MINA GUTIERREZ MARIA FERNANDA

MAESTRA: NIUZET ADRIANA CRUZ PÁEZ

UNIVERSIDAD DEL SURESTE

LICENCIATURA EN ENFERMERIA

ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

TAPACHULA, CHIAPAS

30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



PERIODOS DEL TRABAJO DEL PARTO





Consiste en una serie de contracciones uterinas ritmicas y progresivas que gradualmente hacen descender al Peto por la cérvix (evello del útero) y la vagina (canal del parto).

Etapas des Parto.

Primera Itapa.

Desde el Principio de los trabasos de Parto hasta la dilatación completa del cuello Uterino lunos 10 cm).

VFase inicial llabantel:

Des contracciones son irregulares al principio,

Pero se vuelven cada vez más fuertes


y rritmicas. Il maiestar es minimo, pero puede
aumentar con el tiempo. Il uterino comienza a
adeigazer y se dilata hasta unos 4 o 5 centimetros.

Virase activa: El cuello uterino se dilata desde unos 4 centimetros hasta que se une con el utero, se hace más degado y se ver verirando (borrando) hasta que se une con el vesto del utero.



Segunda Etapa.

Desdede la dilatación completa del cuello uterino hasta el nacimiento del bebé: esta etala suele durar aproximademente 2 horas en un primer embarazo y aproximadamente 1 hora en embarazos posteriores.



Desde et nacimiento del bebé hasta la expussión de la placenta; esta etaba suere duvar unos minutos cunque suere duvar hasta 30 minutos. Puede hesta 30 minutos.



BIBLIOGRAFIA

• Periodos del trabajo del parto https://www.stanfordchildrens.org/es/to pic/default?id=labor-85-P04320#:~:text=La%20fase%20activa %20est%C3%A1%20marcada,y%20es %20la%20%C3%BAltima%20fase.

https://espanol.nichd.nih.gov/salud/temas/labor-delivery/informacion/etapas