



UDS

Mi Universidad

Super Nota

Nombre del alumno: Jesús Alexander Arismendi López

Nombre del tema: Paciente Politraumatizado

Parcial: 2do

Nombre de la Materia: Enfermería en Urgencias y Desastre

Nombre del profesor: Cecilia de la Cruz Sánchez

Nombre de la Licenciatura: Lic. en Enfermería

Cuatrimestre: 7mo Cuatrimestre

Paciente Politraumatizado

Concepto

El paciente politraumatizado es aquel que presenta lesiones a consecuencia de un traumatismo que afectan a dos o más órganos, o bien aquel que presenta al menos una lesión que pone en peligro su vida.



Causas

Las causas más habituales son: accidentes de tráfico, ahogamiento, lesiones intencionadas, incendios y caídas. Estos mecanismos y las características del paciente pediátrico hacen suponer que, ante cualquier traumatismo de elevada energía, todos los órganos pueden lesionarse hasta que no se demuestre lo contrario

Complicaciones

La principal complicación que provoca la muerte al paciente politraumatizado es la hemorragia; la coagulopatía secundaria al daño traumático se ha asociado al peor pronóstico y muerte. El Colegio Americano de Cirujanos recomienda la reanimación agresiva basándose en modelos experimentales



Tipos

Traumatismos articulares: son aquellos que afectan a las articulaciones, como esguinces o luxaciones.

Traumatismos óseos: afectan al hueso, como fracturas completas, fisuras, etc. Encontramos traumatismos de cráneo y cara, de la columna vertebral y politraumatismos.

Causas

Las principales causas de politraumatismo son:

- Accidentes de vehículos motorizados;
- Atropellos;
- Explosiones;
- Quemaduras;
- Amputaciones;
- Golpes o lesiones en varias partes del cuerpo.



Tratamiento

El tratamiento del politraumatismo comienza primero con el Servicio de Atención Médica de Urgencias junto con los bomberos en el lugar del accidente.

Las lesiones se identifican y estabilizan siguiendo un protocolo conocido como ABCDE:

- **A (vías aéreas o airways)**
- **B (respiración o breathing):**
- **C (circulación o circulation):**
- **D (nivel de conciencia o disability):** Glasgow. Por lo general, una disminución en el nivel de conciencia

atención de enfermería en pacientes politraumatizados



Referencia bibliográfica

- https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/19_paciente_politraumatizado.pdf
- https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872013001100008#:~:text=La%20principal%20complicaci%C3%B3n%20que%20provoca,peor%20pron%C3%B3stico%20y%20muerte6.
- <https://www.topdoctors.es/diccionario-medico/traumatismos>
- <https://www.tuasaude.com/es/politraumatismo/>
-