



Mapas conceptuales y cuadros sinópticos.

Nombre del Alumno: Vania Susana Sánchez López.

Nombre del tema: Unidad II. Embarazo, vida prenatal, alumbramiento y apego.


Parcial: I

Nombre de la Materia: Psicología Evolutiva.


Nombre del profesor: Lic. Antonio Galera Pérez.

Nombre de la Licenciatura: Lic. En Trabajo Social y Gestión Comunitaria.


Cuatrimestre: Séptimo.



Problemas fetales.



Situación vital de la mujer embarazada



Problemas comunes en el recién nacido.

Distensión abdominal

El abdomen del niño se siente hinchado y duro y no ha tenido deposición o tiene vomito se debe llevar al pediatra.

Es probable que se deba a gases o estreñimiento, pero también podría indicar problema intestinal.

Lesiones durante el parto.

Clavícula rota: se cura rápidamente si el brazo de ese lado se mantiene relativamente inmóvil. Incluso puede formarse un pequeño bulto.

Debilidad muscular: causada por la presión o el estiramiento de los nervios conectados a los músculos.

Síndrome del bebe azul.

Puede tener las manos y pies azulados, causado por el frio, deben de recuperar su color rosado apenas se calienten. La cara, lengua y labios pueden volverse azul si él bebe no para de llorar.

Si la piel se vuelve azulado de manera persistente con dificultades para respirar y alimentarse, son signos de que el corazón o pulmones no están funcionando bien.

Tos.

Si él bebe toma liquido muy rápido o trata de beber agua por primera vez, es posible que tosa, eso debe detenerse al ajustar su rutina de alimentación.

Si tose continuamente esto podría indicar un problema subyacente en los pulmones o el tracto digestivo.

Llanto excesivo.

Todos los recién nacido lloran. Por lo que se debe asegurar que él bebé lo hayan alimentado, hecho eructar, ver si el pañal esta limpio, etc.

También puede ser ocasionado por algún dolor, en ese caso se debe consultar un doctor.

Problemas comunes en el recién nacido.

Marcas de fórceps.

Cuando se usa durante el parto puede dejar marcas rojas, incluso raspadas superficiales en la cara y cabeza, donde el metal ejerce presión sobre la piel, esto desaparece en pocos días.

A veces se desarrolla un bulto en estas zonas, también suele desaparecer en el término de dos meses.

Ictericia.

Tinte amarillento en la piel. Debido a la acumulación de bilirrubina. Ocurre cuando el hígado inmaduro aun no cumple con su función de eliminar la bilirrubina.

Es común en bebés que están en periodos de lactancia, en aquellos que toman pecho incorrectamente. Aparece en cara, pecho y abdomen.

Letargo y adormecimiento.




Los recién nacido pasan la mayoría del tiempo durmiendo, pero si no se despiertan solos para comer o parecieran demasiados cansados, se debe consultar un pediatra.

Si es un cambio repentino en su patrón habitual pueden ser síntomas de una enfermedad grave.

Dificultad respiratoria.

Si respira de una manera inusual a menudo, se debe a un bloqueo en los conductos nasales. Usar gotas nasales de solución salina y un a perilla succionadora solucionaría el problema.

Signos de advertencia:

-  Respiración rápida
-  Retracciones
-  Ensanchamiento de nariz.

Referencias:

**Universidad del sureste (UDS), antología “psicología evolutiva”, pág.: 39-61 2024.
Pichucalco, Chiapas.**