

PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE EN LA MUJER DURANTE EL PARTO

La muerte materna se refiere a la defunción de una mujer durante el embarazo, el parto o el posparto

HEMORRAGIA MATERNA

La hemorragia grave materna es una emergencia obstétrica que puede ocurrir durante el embarazo, el parto o el puerperio. Es la segunda causa de muerte materna

Entre las causas más comunes de hemorragias grave maternas se encuentran:

- Placenta previa: una condición en la que la placenta se localiza en la parte baja del útero, cerca de la salida del canal del parto.
- Desprendimiento prematuro de placenta: una condición en la que la placenta se separa del útero antes de la fecha de parto prevista.
-

- Atonía uterina: la incapacidad del útero de contraerse después del parto, lo que puede llevar a un sangrado continuo.
- Traumatismo físico: lesiones durante el parto que pueden causar hemorragias internas.
- Retención de tejido placentario: cuando porciones de la placenta o del feto permanecen adheridos al útero, lo que puede causar hemorragias.
- Embarazo ectópico: un tipo de gestación en la que el embrión implanta en un lugar diferente al útero, como una trompa de Falopio.

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA MATERNA

La enfermedad hipertensiva materna se refiere a la hipertensión arterial que aparece durante el embarazo, después de las 20 semanas de gestación

Tipos de Enfermedad Hipertensiva Materna
Existen diferentes clasificaciones de la enfermedad hipertensiva materna, incluyendo:

- Hipertensión Gestacional: hipertensión arterial sin proteinuria que aparece después de las 20 semanas de gestación.

- Preeclampsia: hipertensión arterial con proteinuria que aparece después de las 20 semanas de gestación, y puede ser grave y requerir atención médica inmediata.
- Eclampsia: aparición de convulsiones en una gestante con preeclampsia.

INFECCIONES POSPARTO

Las infecciones posparto (infecciones puerperales) son una complicación común después del parto, afectando a la madre.

Tipos de Infecciones Posparto

- Endometritis: Infección del tracto genital superior, incluyendo el endometrio, miometrio y tejido circundante.
 - Pielonefritis: Infección renal, causada por bacterias que se propagan desde la vejiga urinaria.
- Cistitis: Infección de la vejiga urinaria, causada por bacterias como Escherichia coli.
 - Infección de herida quirúrgica: Infección en la incisión de la cesárea, causada por bacterias presentes en el área.
 - Infección perineal: Infección en el perineo, causada por bacterias y otros microorganismos.

buscado en:

1. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-53372004000100006
2. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
3. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582014000200009
4. <https://www.imss.gob.mx/sites/all/statics/guiasclinicas/162GER.pdf>
5. <https://www.elsevier.es/es-revista-revista-medica-clinica-las-condes-202-articulo-hemorragia-del-postparto-principales-etilogias-S0716864014706492>
6. <https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressureinpregnancy.html>
7. <https://www.elsevier.es/es-revista-progresos-obstetricia-ginecologia-151-articulo-trastornos-hipertensivos-del-embarazo-13108003>
8. http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2304-51322018000200006
9. <https://www.msmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/cuidados-posparto/infecciones-posparto-despu%C3%A9s-del-parto-puerperales>
10. <https://flo.health/es/ser-mama/la-recuperacion-tras-el-parto/complicaciones/infeccion-puerperal>
- 11.