



Nombre Del Estudiante: Griselda Guzmán Sánchez

Tema: Asistencia y Cuidado Durante el Parto

Parcial: 1

Materia: Enfermería en el Cuidado de la Mujer

Nombre De La Profesor: L.O.E. Alfonso Velázquez Ramirez

Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: Cuarto

Pichucalco, Chis 28 de Noviembre de 2024

UNIDAD IV

ASISTENCIA Y CUIDADOS DURANTE EL PARTO



La Asistencia y Control del Parto es un procedimiento que debe realizar un especialista para acompañar a la mujer durante su proceso de embarazo y en el nacimiento del

bebé

El objetivo de esta atención previa es poder disminuir los riesgos que pueden ocurrirle a la paciente durante la gestación y el Parto.



¿Por qué se realiza?



Por medio de la Asistencia y Control del Parto el especialista se puede disminuir los riesgos durante un Parto natural, por ejemplo de que la mujer pueda tener una hemorragia al parir y cualquier otra complicación de esta índole, igualmente si el feto está en una posición que no es la correcta.

Por ello, es importante tener un soporte de especialistas, para tener un nacimiento del bebé con toda la confianza de que todo puede salir bien.

Una vez que los padres decidan cómo tener a su bebé, se define el equipo de apoyo determinado, que estarán en todo momento preparados para cualquier complicación durante las etapas del Parto siguientes:

ALTERNATIVAS A ESTE TRATAMIENTO

Más que una alternativa, la Asistencia y Control del Parto cambia en cada tipo de parto que se lleve a cabo. Algunos tipos de parto son:



CAUSAS DE MORTALIDAD MATERNA

Las mujeres mueren de complicaciones durante o tras el embarazo o el parto. La mayoría de estas complicaciones aparecen durante el embarazo, y son, en su mayoría, prevenibles o tratables; otras podían existir ya antes del embarazo, pero se agravan con la gestación, especialmente si no se tratan como parte de la atención a la mujer. Las principales complicaciones, causantes de prácticamente el 75% de todas las muertes maternas, son :

La muerte de una mujer en el parto, o poco después por causas relacionadas con el alumbramiento, es una situación especialmente traumática. Lo que se espera que sea un momento

de plena felicidad se convierte en todo lo contrario. La relación entre el niño y el progenitor sobreviviente puede sufrir daños permanentes. A menudo el pequeño se siente culpable por la pérdida de su mamá, lo cual afecta su autoestima y otros aspectos de su desarrollo psicológico. En ocasiones, de manera inconsciente, los familiares de la mujer fallecida culpan a su pareja por lo ocurrido. Incluso para los médicos que participan en el hecho lo sufren como un hecho doloroso.

FASES DE LA ATENCIÓN AL PARTO

La primera fase es un adecuado control prenatal que debe contar con al menos con 8 consultas de acuerdo a la Norma Oficial Mexicana (NOM); durante el control prenatal es deseable que se realice un plan de parto (o cesárea en caso de requerirse), en el cual se describen los deseos de la mujer sobre como desea dar a luz y se pone el acuerdo de mantenerla informada de todo lo que ocurra durante el proceso para hacerla partícipe de las decisiones.

Posterior a esta fase se presenta el trabajo de parto que se puede dividir en 2 etapas:

Fase latente: es el tiempo que tarda la mujer en desencadenar contracciones regulares y alcanzar una dilatación del cuello del cérvix de 6 cm, durante esta etapa si no hay datos de alarma (sangrado activo, deterioro fetal, etc.) no es necesario el internamiento o el estar confinada a cama y el plan está enfocado en el manejo del dolor y el acompañamiento de la madre, por ejemplo con inmersión en agua o ejercicios.

Fase activa: esta inicia de los 6 cm de dilatación hasta que se cumplen 10 cm y se desea pujar, durante esta etapa se realiza un seguimiento del patrón del latido cardíaco fetal, para determinar cómo está reaccionando al Estrés del parto, y se pueden realizar un par de tactos vaginales para verificar el avance. Sin embargo, hay que considerar que el tacto vaginal actualmente debe de ser muy espaciado para evitar molestias en la mujer.



Las hemorragias graves tras el parto pueden matar a una mujer sana en dos horas si no recibe la atención adecuada. La inyección de oxitocina inmediatamente después del parto reduce el riesgo de hemorragia.

Las infecciones tras el parto pueden eliminarse con una buena higiene y reconociendo y tratando a tiempo los signos tempranos de infección.

La preeclampsia debe detectarse y tratarse adecuadamente antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras complicaciones potencialmente mortales. La administración de fármacos como el sulfato de magnesio a pacientes con preeclampsia puede reducir el riesgo de que sufran eclampsia.

Para evitar la muerte materna también es fundamental que se eviten los **embarazos no deseados o a edades demasiado tempranas**. Todas las mujeres, y en particular las adolescentes, deben tener acceso a la contracepción, a servicios que realicen abortos seguros en la medida en que la legislación lo permita, y a una atención de calidad tras el aborto.



BIBLIOGRAFIA

- 1.- <https://www.topdoctors.mx/diccionario-medico/asistencia-y-control-del-parto/>
- 2.- <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/maternal-mortality>
- 3.- Índice de fragilidad de los Estados. Puede consultarse en: <https://fragilestatesindex.org/data/>.
- 4.- Say L, Chou D, Gemmill A et al. Global Causes of Maternal Death: A WHO Systematic Analysis. Lancet Global Health. 2014;2(6): e323-e333.
- 5.- Samuel O, Zewotir T, North D. Decomposing the urban–rural inequalities in the utilisation of maternal health care services: evidence from 27 selected countries in sub-Saharan Africa. Reprod Health 18, 216 (2021).
- 6.- <https://ayudaenaccion.org/blog/mujer/mortalidad-materna/>
- 7.- https://www.eldiario.es/consumoclaro/causas-mujeres-mueran-parto-espana_1_3000543.html
- 8.- <https://news.un.org/es/story/2023/02/1518822>
- 9.- <https://www.msdmanuals.com/es/hogar/salud-femenina/complicaciones-del-embarazo/mortalidad-materna-y-mortalidad-perinatal>
- 10.- <https://www.unicef.org/es/comunicados-prensa/cada-dos-minutos-muere-una-mujer-por-complicaciones-embarazo-parto>

