



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Nallely Trinidad Alegria Dodero.

Nombre del tema: Asistencia y cuidados durante el parto

Parcial: 1

Nombre de la Materia: Enfermería en cuidados de la mujer

Nombre del profesor: Alfonso Velázquez Ramírez

Nombre de la Licenciatura: Lic. Enfermería.

Cuatrimestre:4to.

Principales causas de muerte durante el parto.



Ruptura prematura de membranas (RPM)

Ocurre cuando la fuente se rompe antes de que la madre entre en trabajo de parto. Si el parto no comienza poco después, puede aumentar el riesgo de infección

Cómo actúa enfermería:


Detener el sangrado lo antes posible, Reemplazar los líquidos y la sangre perdidos, Evitar el shock, Proporcionar apoyo emocional y analgesia

Parto obstruido

En ocasiones, la pelvis materna puede impedir la salida del feto. Esto sucede cuando el bebé es demasiado grande en relación con el tamaño de las caderas de la madre, cuando nacen gemelos, cuando la madre mide menos de 150 cm... En estos casos, tanto el bebé como la madre tienen un elevado riesgo de fallecer.

Cómo actúa enfermería:

- Evaluar la aptitud de la paciente para caminar o subir escaleras, observando si presenta esfuerzo respiratorio o dificultad para hablar.
- Valorar los niveles de glucosa en la sangre para descartar diabetes gestacional.
- Evaluar la aparición de edemas en las extremidades inferiores y el aumento de la tensión arterial.
- Valorar el grado de ansiedad verbalizada por la paciente



Proteinuria

Es un aumento en la cantidad de proteínas en la orina que puede indicar un problema renal. Puede ser un síntoma de la preeclampsia, una complicación del embarazo que puede tener consecuencias graves para la madre y el bebé.

Cómo actúa enfermería:

- Evaluar, monitorizar y cuidar a la madre y al feto
- Medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de la paciente
- Revisar la orina de la paciente en busca de proteína
- Vigilar la cantidad de líquido que toma la paciente
- Revisar el peso de la paciente
- Observar la frecuencia con la que se mueve y patea el bebé

Aborto

El aborto inseguro es una de las principales causas de mortalidad materna en el mundo. Algunas de las consecuencias médicas irreversibles de un aborto inseguro son:

Hemorragia grave, Infección, Peritonitis, Lesiones en vagina y útero, Discapacidad permanente, Infertilidad

Como actúa enfermería:

- Proporcionar analgésicos o antieméticos prescritos
- Observar si se producen hemorragias o retortijones
- Controlar los signos vitales, como la temperatura y la presión arterial
- Administrar antibióticos
- Controlar las manifestaciones clínicas de la infección
- Apoyar a la paciente emocionalmente para potenciar su autoestima
- Favorecer la conversación o el llanto como medio de disminuir la respuesta emocional



Referencias

- 1.-(s.f.). Obtenido de http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726-89582014000200009
- 2.-(s.f.). Obtenido de <https://inper.mx/descargas/pdf/Muerte%20Materna.pdf>
- 3.-(s.f.). Obtenido de <https://www.msmanuals.com/es/professional/trastornos-urogenitales/s%C3%ADntomas-de-los-trastornos-urogenitales/proteinuria?ruleredirectid=757>
- 4.-(s.f.). Obtenido de <https://www.kidney.org/es/kidney-topics/albuminuria-proteinuria>
- 5.-(s.f.). Obtenido de <https://gpnotebook.com/es/pages/obstetricia/problemas-durante-el-parto/trabajo-de-parto-obstruido>
- 6.-(s.f.). Obtenido de <https://medlineplus.gov/spanish/childbirthproblems.html>
- 7.-(s.f.). Obtenido de <https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=3103§ionid=264041254>
- 8.-(s.f.). Obtenido de <https://www.salusplay.com/planes-de-cuidados-de-enfermeria/enfermedad/parto-obstruido>
- 9.-accion, a. e. (s.f.). Obtenido de <https://ayudaenaccion.org/blog/mujer/mortalidad-materna/>
- 10.-gob.mx, s. s. (s.f.). Obtenido de https://epidemiologia.salud.gob.mx/gobmx/salud/documentos/manuales/15_Manual_Muertes_Maternas_Lineamientos.pdf
- 11.-ims. (s.f.). Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/885924/MM_2024_SE04.pdf