

## **Infografía**

**Nombre de la alumna: Erika Mateo Altunar**

**Nombre del Tema: practica de Enfermería en  
Pacientes con Descompensación Diabético**

**Parcial:7**

**Nombre de la Materia: Enfermería en Urgencias y  
Desastres**

**Nombre del profesor: Selene Ramírez Reyes**

**Nombre de la licenciatura: Enfermería**

**Cuatrimestre: 7°**

## INTRODUCCIÓN

La diabetes es una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. La descompensación diabética es una complicación grave que puede llevar a la hospitalización e incluso la muerte. Como enfermeros es fundamental que estemos preparados para manejar estos casos de manera efectiva y proporcionar una atención de alta calidad a nuestros pacientes. La práctica de enfermería no implica solo la administración de medicamentos y tratamientos, sino también la educación y el apoyo emocional para los pacientes y sus familiares. Los enfermeros juegan un papel crucial en la detección temprana, el manejo y la educación de los pacientes con descompensación diabética.

La descompensación diabética es una emergencia médica que requiere una atención inmediata y especializada.

El plan de cuidados se ha desarrollado, cuyo objetivo central es el paciente, valorar la calidad de vida de esas personas, determinar sus recursos y potenciando las intervenciones educativas y preventivas.

## INDICE

Introduccion.....	2
Indice.....	3
Practica de enfermeria en pacientes con descompensacion diabetica.....	4
Objetivo.....	5
Tipos de descompensacion.....	6
Conclusion.....	8
Biibliografia.....	9

**La descompensación diabética**  
 Es una descompensación aguda de la diabetes que se caracteriza por un aumento de la glucemia, acidosis y acetonemia.

**Cestocidas diabética**  
 Se origina a raíz de un déficit de insulina y su consecuencia aumento de hormonas contra reguladoras.

**¿qué es la descompensación diabética?**  
 Estado en el que el cuerpo no puede regular los niveles de azúcar en la sangre.



**Practica de enfermería en pacientes con descompensación diabética**

- Causas**
- Falta de control de glucémico
  - Enfermedades crónicas
  - Infecciones
  - Estrés
  - Cambios en la medicación



- ¿cuáles son los Síntomas?**
- Sed excesiva
  - Hambre extrema
  - Fatiga
  - Visión borroso
  - Dolor de cabeza
  - Náuseas y vómitos

- Objetivo**
- Restablecer el equilibrio glucémico
  - Controlar los síntomas
  - Prevenir complicaciones
  - Mejorar la calidad de vida



**Tipos de descompensación diabética:**

**Hiperglucemia** (niveles altos de azúcar en la sangre)

Los síntomas más frecuentes de hipoglucemia son: sensación de debilidad general, con temblor de piernas y manos. Hambre excesiva, mareos, visión doble, sudor frío, dolor de cabeza, confusión, agresividad.

**Hipoglucemia** (niveles bajos de azúcar en la sangre).



**Cetoacidosis diabética** (condición grave que ocurre cuando el cuerpo produce cetonas).

**Cetoacidosis diabética**

**Síntomas**  
 Náusea y vomito  
 Sed y poliuria  
 Dolor abdominal  
 Disnea

**Datos exploratorios**  
 Taquicardia  
 Deshidratación e hipotensión  
 Taquipnea, respiración de Kussmaul y dificultad respiratoria.  
 Sensibilidad abdominal a la palpación  
 Letargo o embotamiento

**Hiperglucemia**  
 Cetosis  
 Acidosis metabólica

## ¿Cuáles son los síntomas de una subida de azúcar?



- ❖ Sus signos y síntomas que puedes notar son: Comienzo lento y progresivo, piel seca y caliente, mucha sed (boca muy seca), aliento con olor a frutas, falta de apetito, dolor de estómago, náuseas y posibles vómitos, visión borrosa, debilidad, somnolencia y malestar general en aumento, dificultad para respirar, gran cantidad de azúcar y acetona en la sangre, gran cantidad de orina, gran cantidad de azúcar y acetona en la orina. En caso de persistir, se puede llegar a la deshidratación y el coma.

## ¿Cuáles son los síntomas de una bajada de azúcar hipoglucemia



## Conclusion

La descompensación diabética es una emergencia médica que requiere una intervención rápida y efectiva por parte del equipo de enfermería. Identificar factores, síntomas tempranos, fomentar la participación activa del paciente en su cuidado.

La descompensación diabética requiere una intervención rápida y efectiva por parte del equipo de enfermería, para mejorar la calidad de vida de los pacientes, controlar los síntomas, aumentar la energía y el bienestar.

## Bibliografía

<https://manualclinico.hospitaluvrocio.es/urgencias/endocrino/descompensacion-diabetica-cetoacidosis-diabetica/#:~:text=Descompensaci%C3%B3n%20aguda%20de%20la%20diabetes,consecuente%20aumento%20de%20hormonas%20contrarreguladoras.>

<https://www.pacientesycuidadores.com/en-detalle/diabetes/sintomas-descontrol-diabetes/#!prettyPhoto>

[MedlinePlus \(.gov\)](#)

<https://medlineplus.gov> > ... > Enciclopedia médica

[Hipoglucemia - Síntomas y causas](#)

[Mayo Clinic](#)

<https://www.mayoclinic.org> > syc-20373685