



**Mi Universidad**

## **CUADRO SINOPTICO**

*Nombre del Alumno: Valeria Montserrat Ramírez Ocampo*

*Nombre del tema: cuadro sinoptico*

*Parcial: 1er parcial*

*Nombre de la Materia: Enfermería clínica*

*Nombre del profesor: E.E.C./C.H. Marcos Jhodany Arguello Galvez*

*Nombre de la Licenciatura: licenciatura en enfermería*

*Cuatrimestre: 4ER cuatrimestre*

## Los principales factores que contribuyen al desarrollo de las UPP son:

1. PRECIÓN: Es la fuerza por unidad de superficie perpendicular a la piel
2. FRICCIÓN: es la fuerza ejercida que actúa paralelamente en la piel
3. DE PINZAMIENTO VASCULAS: Combina los efectos de presión y fricción

### grado 1

- limitada a las capas superficiales de la piel
- se manifiesta a través de enrojecimiento y no existe pérdida de tejido
- puede tardar en curarse de 2 a 3 días aprox

### grado 2

- afecta a las capas superficiales de la piel y se prolonga a la primera porción del tejido graso subyacente
- se mantiene con erosiones, ampollas y desgarros superficiales
- se puede lograr curar en 1 a 2 semanas aprox

### grado 3

- Se extiende mas profundamente a través de las estructuras superficiales, afecta la grasa subcutánea, produciendo necrosis del tejido, pero sin comprometer los músculos
- Se puede curar entre 1 o 3 meses aprox

### grado 4

- Destrucción de todo el tejido blando, desde la piel hasta el hueso
- el nivel de ulceración llega al músculo, huesos, articulaciones.
- se puede curar en meses o años y en algunos casos no se consigue curación total

## que son las UPP?

La úlcera por presión (UPP) es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Son un problema grave y frecuente en personas de edad avanzada.

## Clasificación.

La clasificación de las lesiones por presión (LPP) o úlceras por presión se hace según el tejido cutáneo que comprometa, esto quiere decir que se clasifica de acuerdo a la profundidad de afectación de los tejidos de la piel.

# ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP)

Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo.

