



Mi Universidad

CUADRO SINOPTICO

Nombre del Alumno: Valeria Montserrat Ramírez Ocampo

Nombre del tema: cuadro sinoptico

Parcial: 4to parcial

Nombre de la Materia: Enfermería clínica

Nombre del profesor: E.E.C./C.H. Marcos Jhodany Arguello Galvez

Nombre de la Licenciatura: licenciatura en enfermería

Cuatrimestre: 4ER cuatrimestre

Los principales factores que contribuyen al desarrollo de las UPP son:

1. PRECIÓN: Es la fuerza por unidad de superficie perpendicular a la piel
2. FRICCIÓN: es la fuerza ejercida que actúa paralelamente en la piel
3. DE PINZAMIENTO VASCULAS: Combina los efectos de presión y fricción

grado 1

- limitada a las capas superficiales de la piel
- se manifiesta a través de enrojecimiento y no existe pérdida de tejido
- puede tardar en curarse de 2 a 3 días aprox

grado 2

- afecta a las capas superficiales de la piel y se prolonga a la primera porción del tejido graso subyacente
- se mantiene con erosiones, ampollas y desgarros superficiales
- se puede lograr curar en 1 a 2 semanas aprox

grado 3

- Se extiende mas profundamente a través de las estructuras superficiales, afecta la grasa subcutánea, produciendo necrosis del tejido, pero sin comprometer los músculos
- Se puede curar entre 1 o 3 meses aprox

grado 4

- Destrucción de todo el tejido blando, desde la piel hasta el hueso
- el nivel de ulceración llega al músculo, huesos, articulaciones.
- se puede curar en meses o años y en algunos casos no se consigue curación total

que son las UPP?

La úlcera por presión (UPP) es una lesión de origen isquémico, localizada en la piel y tejidos subyacentes con pérdida de sustancia cutánea producida por presión prolongada o fricción entre dos planos duros. Son un problema grave y frecuente en personas de edad avanzada.

Clasificación.

La clasificación de las lesiones por presión (LPP) o úlceras por presión se hace según el tejido cutáneo que comprometa, esto quiere decir que se clasifica de acuerdo a la profundidad de afectación de los tejidos de la piel.

ÚLCERAS POR PRESIÓN (UPP)

Las úlceras por presión son áreas de piel lesionada por permanecer en una misma posición durante demasiado tiempo.

