



NOMBRE DEL ALUMNO:
SOLIS BONIFAZ ZURISADAI

NOMBRE DEL TEMA
MANEJO DE ULCERA POR PRESION

NOMBRE DE LA MATERIA:
ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

NOMBRE DEL DOCENTE:
MARCOS JHIRDANY ARGUELLO GALVEZ

LICENCIATURA
LIC. EN ENFERMERIA



MANEJO DE ULCERA POR PRESION

UPP

Contribuye un tipo especial de lesiones. se considera por un trastorno de ir regulacion sanguinea y nutricion tisular Como resultado de presion arterial prolingada sobre provinencias osea o cartilaginosas

CAUSAS

Flujo de sangre

T/A-120-129mnhe

llenado capilar

factores de riesgo

presion

friccion

fuerza externa de pinzamiento vascular

Decubito dorsal

es una posicion anatomica del cuerpo humano que se caracteriza por:

talones

sacro

codos

omoplato

cabeza

Localizaciones de UPP

decubito lateral

es una posicion anatomica del cuerpo humano en la que el cuerpo se encuentra acostado de lado, con el cuerpo paralelo al suelo.

malcolo

condilos

trocanter

costillas

acromio

oreja

MANEJO DE ULCERA POR PRESION

UPP

decubito prono

posicion corporal tendido boca abajo y la cabeza de lado (es la posicion ideal de un paciente).

- dedos
- rodillas
- genitales(hombres)
- mamas (mujeres)
- acromios
- mejilla

factores de riesgo

- friccion
- fuerza externa de pinzamiento vascular

Decubito dorsal

es una posicion anatomica del cuerpo humano que se caracteriza por:

- talones
- sacro
- codos
- omoplato
- cabeza

porcentaje de riesgo

bajo nivel de consciencia o estado mental
uso de medicamentos:
corticoides o vascular, a la piel respiratorias

- malcolo
- condilos
- trocanter
- costillas
- acromio
- oreja

Localizaciones de UPP



MANEJO DE ULCERA POR PRESION

ULCERAS POR PRESION

ULCERAS POR PRESION

GRADO 1

Limitada a las capas superficiales de la piel
se manifiesta a traves de enrojecimiento y no existe perdida de tejidos (se mantiene la integridad de la piel)
puede tardar en curarse - 2 a 3 dias aprox

GRADO 2


Afecta a las capas superficiales de la piel y se prolonga a la primera porcion del tejido graso subyacente.

GRADO 3

Se extiende mas profundamente a traves de las estructuras superficiales- afectan a la grasa subcutanea, produciendo necrosis del tejido, pero sin comprometer los musculos

GRADO 4

Destruccion de todo el tejido blando, desde la piel hasta el hueso
nivel de ulceracion llega al musculo, hueso, articulaciones, cavidades organicos adyacentes y estructuras de sosten.



MANEJO DE ULCERA POR PRESION

TRATAMIENTOS DE ULCERAS DE SEGUNDO GRADO

GRADO 2

El tratamiento de ulcera por presion implica reducir la presion sobre la piel afectada, cuidar las heridad, controlar el dolor, prevenir la inflamacion y mantener una buena nutricion.

equipo de tratamiento

un profesional de atencion primaria que supervisa el plan de tratamiento.

un profesional de atencion medica especializado en el cuidado de heridas.

