



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Ana Karen Tolentino Martínez

Nombre del tema: Colecistitis

Parcial: 2

Nombre de la Materia: Fisiopatología

Nombre del profesor: Felipe Antonio Morales Hernández

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 4

Colecistitis

¿Qué es?

Es la inflamación de la vesícula biliar causada principalmente por piedras en la vesícula, llevando al surgimiento de síntomas como dolor tipo cólico del lado derecho del abdomen, náuseas, vómitos, fiebre o sensibilidad a la palpación del abdomen.

La vesícula biliar es una pequeña bolsa que almacena la bilis, un fluido muy importante para la digestión de grasas, y cuando está inflamada puede causar síntomas intensos y de rápido empeoramiento


Síntomas

- Dolor tipo cólico en la parte superior derecha del abdomen;
- Náuseas e vómitos;
- Pérdida del apetito;
- Fiebre debajo de 39°C;
- Malestar generalizado;
- Palpitaciones cardíacas;
- Sensación de hinchazón y exceso de gases;
- Piel y ojos amarillentos, en algunos casos.

Posibles causas

La principal causa de colecistitis es la piedra en la vesícula, ya que impide que la bilis sea liberada hacia el intestino, causando una inflamación en la vesícula biliar.

- Piedras en la vesícula
- Nódulo o tumor en la vesícula
- Bloqueo del ducto biliar



- Infecciones
- Daños en los vasos sanguíneos

Tipos de colecistitis

Los tipos de colecistitis pueden clasificarse de acuerdo al mecanismo que la originó, e incluye

Aguda

Causada principalmente por piedras en la vesícula, que causan una obstrucción del ducto que forma parte del vaciamiento de la bilis. Por ello, la bilis se acumula en la vesícula y esta se distiende e inflama.

Crónica

Causada por pequeños episodios de inflamación de la vesícula biliar, que se producen varias veces a lo largo del tiempo. Como consecuencia de estas crisis repetidas, la vesícula puede sufrir alteraciones, haciéndose más pequeña y con paredes más espesas.

Alitiásica

Es más rara y causa la inflamación de la vesícula sin la presencia de cálculos, pudiendo ser desencadenada por factores como largos períodos de ayuno, nutrición parenteral total o pérdida de peso rápida, resultando en la alteración de la función de la vesícula.

Ayuno

El médico puede recomendar la realización de ayuno, para que de esta forma no haya ingesta de comida y agua durante algún tiempo para aliviar la presión en la vesícula

Fluidos intravenosos

Se aplican directamente en la vena debido a la restricción para comer o beber líquidos, por lo que es necesario mantener la hidratación del organismo.

Medicamentos

- Analgésicos: pueden utilizarse hasta que el dolor se alivie y la inflamación de vesícula se reduzca;
- Antibióticos: en más de la mitad de los casos, la vesícula se infecta 48 horas después del inicio de la colecistitis, ya que su distensión facilita la proliferación de bacterias en su interior.

Cirugía

es la principal forma de tratamiento de la colecistitis y, generalmente se realiza por laparoscopia, ya que permite una recuperación más

it's time to take action!

El tratamiento para la colecistitis generalmente se inicia con el internamiento en el hospital para ayudar a controlar la inflamación y aliviar el dolor, para que posteriormente se realice la cirugía de remoción de la vesícula.