



NOMBRE DEL ALUMNO: ODALIS GARCIA MORALES

NOMBRE DEL TEMA: SUPER NOTA

NOMBRE DE LA MATERIA : FISIOPATOLOGIA

NOMBRE DEL PROFESOR: LIC. FELIPE ANTONIO MORALES HERNANDEZ

NOMBRE DE LA LIC: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE : 4

ACTUALIZACION SOBRE FISIOPATOLOGIA Y MANEJO INICIAL DE DIVERTICULITIS AGUDA

Es un desorden gastrointestinal que genera significativa morbilidad y costos al sistema de salud.

Entre los factores correspondientes se encuentran la obesidad, central, el fumador, con la alimentación, alta en carnes rojas y bajas en fibras.

La escala de clasificación más utilizada para guiar el tratamiento agudo es la hinchey, de esta forma, los hinche, pueden abordarse de manera conservadora.



INTRODUCCION:

La diversidad es un desorden gastro intestinal prevalente, con significativa, morbilidad, y costo del sistema de salud ya que la diverticulitis aguda es la inflamación secundaria a micro perforaciones diverticulares

METODOS

En la preparación de esta idea está la revisión de ejecución una búsqueda en las bases de datos pubmed, con los términos de búsqueda [diverticulitis]

TERMINOLOGIA

En primer lugar los divertículos son proyecciones saculares de la pared intestinal, como la presencia diverticular intestinal.

EPIDEMIOLOGIA

A lo largo de la vida, el riesgo de diverticulitis es de 10% a 25%, sin embargo, estas estimaciones datan de años previos al uso rutinario de endoscopio

FISIOPATOLOGIA

Historicamente se creía que la inflamación que lleva a la diverticulitis era secundaria a una infección diverticular primaria, no obstante no se detecta ningún patógeno.

FACTORES DE RIESGO

Estudios modernos han confirmado y expandido el rol de la dieta.

TRATAMIENTO

Diverticulitis no afecta la clasificación de hinchey, modifica el tratamiento (6,7) en la diverticulitis no complicada.



