



NOMBRE DEL ALUMNO: KARLA JULISSA MORALES MORENO

NOMBRE DEL TEMA: VIGILANCIA Y ATENCIÓN AMIGABLE EN EL TRABAJO DE PARTO EN EMBARAZO DE BAJO RIESGO
PARCIAL: 4TO

NOMBRE DE LA MATERIA: ENFERMERIA EN EL CUIDADO DE LA MUJER

NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

NOMBRE DE LA CARRERA: ENFERMERIA

CUATRIMESTRE: 4TO

PARTO NORMAL

DEFINICION

trabajo de parto en una embarazada sin factores de riesgo durante la gestación, que se inicia de forma espontánea entre las semanas 37 y 42, y que tras una evolución fisiológica termina con el nacimiento de un recién nacido normal que se adapta de forma adecuada a la vida extrauterina.

DURANTE EL PARTO

el cuello del útero debe ablandarse y abrirse completamente ("borrarse"), la mujer debe empujar el bebé hacia el exterior, y el bebé realizar determinados movimientos para salir a través del canal del parto.

¿CUANTO TARDA UN PARTO VAGINAL?

un parto vaginal puede durar desde días a semanas e incluso de minutos a horas; en general dura más tiempo con el primer hijo. El parto precipitado es el que dura un total de 2 a 3 horas desde el comienzo de las contracciones hasta la expulsión del feto.


¿QUE FACTORES INCLUYEN EN EL PARTO?

Las contracciones uterinas.
tamaño del feto: -La situación del feto dentro del útero.
-Presentación fetal.
-Actitud fetal.
-Posición fetal.
-Estación.
Presencia de anomalías fetales.
Tipos de parto vaginal

¿CUALES SON LAS COMPLICACIONES ASOCIADAS?

Complicaciones en el feto: Disminución del aporte de oxígeno. Infección, especialmente cuando transcurren muchas horas entre la rotura de la bolsa de las aguas y el comienzo del parto. Lesiones por traumatismos producidos durante el parto.





PARTO VAGINAL

elle COMPLICACIONES DE LA MADRE

Alteraciones en la evolución del trabajo de parto o distocias. Cesárea. Hemorragias. Infecciones. Desgarros del canal del parto. Para conocer cuándo comienza un parto o cuándo se debe contactar con el ginecólogo o ir al hospital se debe visitar el apartado "trabajo de parto".



elle ¿CUANDO SE DEBE AVISAR AL MEDICO UN TRAS UN PARTO?

Se sangra mucho por la vagina. Es normal sufrir un sangrado vaginal durante unas semanas después del parto, pero si el sangrado es importante o presenta coágulos de sangre grandes se debe avisar al médico.



Se produce un mareo o una pérdida de conocimiento. Aparece fiebre. Aparecen vómitos. Duele en la zona del estómago. Se produce un dolor de cabeza intenso, dificultad de visión o inflamación de manos y pies. Se desencadena un sentimiento de tristeza o desesperación.



BIBLIOGRAFIA



- VIGILANCIA Y ATENCIÓN AMIGABLE EN EL TRABAJO DE PARTO EN EMBARAZO DE BAJO RIESGO

