



Mi Universidad

Super nota

Nombre del Alumno: Ana Paola Lopez Hernández

Nombre del tema: promoción a la salud y esquema nacional de vacunación

Parcial: 4 ta unidad

Nombre de la Materia: Enfermería comunitaria

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la Licenciatura: Enfermería

Cuatrimestre: 7mo cuatrimestre

Fecha y lugar de trabajo: 01/12/2024

¿A QUIÉNES AFECTA?

La mayoría de los ITS afectan a hombres y mujeres. Pero en muchos casos los problemas de salud que causan puede ser más grave en mujeres si una ITS pasa al bebé pueden causar problemas de salud.



PREVENCIÓN

Si decides tener relaciones sexuales, puede reducir su riesgo de contraer una ITS al:

- Realizar pruebas de ITS a usted y su pareja antes de tener relaciones sexuales.
- Utilizar un condón cada que tiene relaciones sexuales. El uso correcto del condón de latex reduce, pero no elimina el riesgo.



ETS

DEFINICIÓN

Son infecciones que se transmiten de una persona a otra a través del contacto sexual.



CAUSAS

- Virus
- Bacterias
- Parasitos



TIPOS DE ETS

- Clamidia
- Herpes Genital
- Gonorrea
- VIH
- VPH
- Sifilis
- Lactias



ESQUEMA DE VACUNACIÓN

ESQUEMA DE VACUNACIÓN					ESQUEMA DE VACUNACIÓN						
VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN	VACUNA	ENFERMEDAD QUE PREVIENE	DOSIS	EDAD Y FRECUENCIA	FECHA DE VACUNACIÓN		
BCG	TUBERCULOSIS	ÚNICA	AL NACER		NEUMOCÓCICA CONJUGADA	INFECCIONES POR NEUMOCOCO	PRIMERA	2 MESES			
HEPATITIS B	HEPATITIS B	PRIMERA	AL NACER				SEGUNDA	4 MESES			
		SEGUNDA	2 MESES				REFUERZO	12 MESES			
		TERCERA	6 MESES		INFLUENZA	INFLUENZA	PRIMERA	6 MESES			
PENTAVALENTE ACELULAR DPAT + VP1 + HIB	DIFTERIA TOSFERINA TÉTANOS POLIOMIELITIS E INFECCIONES POR H. INFLUENZAE B	PRIMERA	2 MESES				SEGUNDA	7 MESES			
		SEGUNDA	4 MESES				REVACUNACIÓN	ANUAL HASTA LOS 59 MESES			
		TERCERA	6 MESES		SRP	SARAMPIÓN RUBEOLA Y PAROTIDITIS	PRIMERA	1 AÑO			
		CUARTA	18 MESES				REFUERZO	6 AÑOS			
DPT	DIFTERIA TOSFERINA Y TÉTANOS	REFUERZO	4 AÑOS		SABIN	POLIOMIELITIS	ADICIONALES				
ROTAVIRUS	DIARREA POR ROTAVIRUS	PRIMERA	2 MESES				SR	SARAMPIÓN Y RUBEOLA	ADICIONALES		
		SEGUNDA	4 MESES								
		TERCERA	6 MESES		OTRAS VACUNAS						