


Nombre de la alumna: Hilary Ariadne Guillén Maldonado.

Nombre de la profesora: Daniela Monserrath Mendez Guillen

Nombre de la licenciatura: Nutrición.

**Cuatrimestre: 4to, cuatrimestre.
Unidad 3**



PATOLOGIAS INTESTINALES

Nutrición en la resección intestinal; colostomía, colectomía, ileostomía y fistula

La cirugía colorrectal es uno de los procedimientos quirúrgicos sobre el tracto digestivo que se realizan con mayor frecuencia.

Nutrición

- Nutrición pre-operatoria
- Nutrición oral
- Nutrición parenteral
- Nutrición enteral
- Pouchitis

Cáncer colorectal.

El cáncer de colon suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos (benignos) de células llamados pólipos que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon.

Los signos y síntomas del cáncer de colon incluyen los siguientes:

- Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluidos diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces
- Sangrado rectal o sangre en las heces
- Molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor
- Una sensación de que el intestino no se vacía por completo
- Debilidad o fatiga
- Pérdida de peso sin causa aparente

Apendicitis

La apendicitis es una inflamación del apéndice, una bolsa en forma de dedo que se proyecta desde el colon en el lado inferior derecho del abdomen.

Causas

La causa probable de la apendicitis es una obstrucción en el recubrimiento del apéndice que da como resultado una infección. Las bacterias se multiplican rápidamente y hacen que el apéndice se inflame, se hinche y se llene de pus.

Diarreas

La diarrea es la evacuación intestinal de heces flojas y líquidas tres o más veces al día

Puede ser

- Aguda
- Persistente o crónica

La diarrea aguda es la más común ya que puede ser por infecciones y por un corto tiempo.

La diarrea persistente o crónica es poco común ya que este suele estar todos el tiempo.

Colitis



La colitis ulcerosa es una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras (llagas) en el tracto digestivo.

Tipos

- Proctitis ulcerosa.
- Proctosigmoiditis.
- Colitis del lado izquierdo.
- Pancolitis.



PATOLOGIAS INTESITNALE



Fisuras

Una fisura anal es un pequeño desgarro en el tejido delgado y húmedo (mucosa) que recubre el ano. La fisura anal puede producirse cuando evacúas heces grandes y duras.

Las causas frecuentes de la fisura anal son las siguientes


- Evacuar heces grandes y duras
- Estreñimiento y esfuerzo durante la evacuación
- Diarrea crónica
- Sexo anal
- Parto

Divertículos

Los divertículos son bolsas abultadas y pequeñas que se pueden formar en el revestimiento del sistema digestivo. Por lo general, se encuentran en la parte inferior del intestino grueso (colon).

Sintomas

- Dolor
- Náuseas y vómitos.
- Fiebre.
- Sensibilidad abdominal.
- Estreñimiento o, con menos frecuencia, diarrea.



Fistulas

Es una conexión anormal entre dos partes del cuerpo, como un órgano o un vaso sanguíneo y otra estructura. Generalmente, las fístulas son el producto de una lesión o cirugía.

Se pueden formar entre

- Una arteria y una vena
- Las vías biliares y la superficie de la piel
- El espacio intracraneal y un seno paranasal
- Los intestinos y la vagina
- El colon y la superficie del cuerpo,
- El estómago y la superficie cutánea
- El útero y la cavidad peritoneal
- Una arteria y una vena en los pulmones
- El ombligo y los intestinos

Cx

La colectomía es un procedimiento quirúrgico en el que se extirpa todo el colon o parte de este.

Tipos de operaciones de colectomía

- La colectomía total
- La colectomía parcial
- La hemicolectomía
- La proctocolectomía

Sangrado del tubo digestivo inferior

El sangrado del tracto gastrointestinal inferior es una condición médica en donde se presenta una hemorragia desde la parte inferior del sistema digestivo, específicamente del intestino grueso, el recto o el ano.

Sintomas

- Sangrado rojo brillante desde el ano o en las heces
- Dolor abdominal
- Mareos
- Palpitaciones
- Debilidad
- Confusión
- desmayo