UDS

DOCENTE: LIC. AMBAR JAQUELINE ALACZAR CANCINO

ALUMNA: JUANA EIRIKA VAZQUEZ ALBORES

TRABAJO: MAPA CONSEPTUAL

MATERIA: PRACTICA DE ENFERMERIA II

GRADO: SEPTIMO CUATRIMESTRE

GRUPO: ENFERMERIA

Presented with xmind

UNIDAD II

TECNICAS ESPECUIALES DE U.C.I

MARCAPASOS TEMPORAL

es mantener la FC hasta hasta que la desrritma haya pasado

MARACAPASO EPICUTANEO TRANSTORICO

tecnica de emergencia que permite estimular

la contraccion ventricular en presenta de

bloqueo AV o bradicardia sincopal

CONTRAPULCCION AORTICA

dsipositivo de asistencia al ventriculo izquirdo

que mejora

la perfucion arterial coronaria

y reduce las postarga por contrapulcion

indicaciones

shock cardiagenico de cualquier indice

defectos mecanicas reversibles

material

kite de catererizacion

carro de parada

PRECEDIMIENTO RELACIONADOS CON DIFERENTES PUNCIONES

PARECENTISIS

procedimiento para la extracion de liquido

tipos

diagnostica

obstencion de muestre de liquido de peritoneo

evacuado o terapeutica

evacuar liquido acumulado en exeso dentro de la cavidad peritonel

kite de catererizacion

carro de parada

PUNCION LUMBAR

prueva que tiene objetivo de recoger liquido cefalorraquideo

riesgo

riesgo de infeccion

riesgo de sangrado

riesgo de cancer

consecuencia

el paciente puede sufrir un fuerte dolor cabeza o nauceas

PERICARDIOCENTESIS

precedimiento que utiliza una aguja para

extraer liquido seca pericardio

riesgo

sangria

pulmon colapsado

ataque al corazon

CONTROLE ANALITICOS EN U.C.I

para realizar extraccion de sangre atravez de la via venula central

procedimiento

proecdimiento con geringas

cargar los 20 cc de suero fisiologico

limpiamos la llave de tres pasos

precedimieto con sistema de extracion vacio (vacutainer)

conectamos al sistema vacio a la via y desechamos

conectamos los tubos necesarios para extraer la sangre directamente

controles rutinarios

es una anlitica que se extrae una vez a la semana

sirve para tener una vicion analitica golbal del paciente

MEDICACION EN U.C.I

aspirina

se administrara en 300gr por via oral

contraindicacion

alergia documentada

lavamos la vias y conectamos un tapon esteril

antecedentes de HDA

ulcera peptico

anoxaparina

de bajo peso molecular

se administra en 1mg/kg

docificacion

el ritmo de infucionse modifica para mantener un TTP de 50-70 segu.

dosis maxima de 5000 u.

tirofivan

prevencion de IAM precoz en pacientes con angina inestable

se admisnitrara en todos los pacientes en exepto de alergias

nutricion parenteral

mantener al paciente y promover su recuprecion

Presented with xmind