MAPA CONSEPTUAL

Nombre del Alumno: Josué Marroquín Sánchez

Nombre del tema:

Parcial: unidad 3

Nombre de la Materia: fundamentos de enfermería

Nombre del profesor: Marcos Jhodany Arguello Gálvez

Nombre de la Licenciatura: enfermería

Cuatrimestre: I

Comitán de Domínguez Chiapas 3 de nov 2024

UNIDAD 3

Nom-022

Esta norma para la administración de la terapia de infusión intravenosa se ha desarrollado con el propósito de establecer las condiciones necesarias y suficientes que favorezcan una práctica clínica homogénea, que coadyuve a lograr una atención segura y libre de riesgos.

La Norma Oficial Mexicana (NOM) 022 tiene como objetivo es establecer los criterios y especificaciones para la prevención y control de riesgos en los centros de trabajo, promueve la implementación de medidas de seguridad y salud ocupacional. su objetivo principal es reducir los riesgos laborales y promover un ambiente de trabajo seguro.

esta norma nos calsifica las

soluciones en cristaloides y coloides.

dentro de las cristaloides

encontramos, hipotonicas,

isotonicas e hipertonicas

y en las coloides encontramos

naturales y sinteticas.

tambien nos habla de la administracion de medicamnetos por via intravenosa.

Nom-045

Esta Norma Oficial Mexicana establece los criterios que deberán seguirse para la prevención, vigilancia y control epidemiológicos de las infecciones nosocomiales que afectan la salud de la población usuaria de los servicios médicos prestados por los hospitales.

Norma Oficial Mexicana 045 tiene por objetivo establecer las especificaciones que deben seguirse para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud, que permitan mejorar la seguridad y calidad de la atención, así como disminuir el riesgo de infección, complicación y muerte en la población usuaria de los servicios de salud.

Esta norma nos habla de los Criterios para el diagnóstico de

infecciones nosocomiales:

Causas:

1. Neumonias

2. Infecciones via urinaria

3. Infección de herida quirúrgica

4. Bacteremia.

Tambien de la importancia de el lavado de manos para evitar transmicion de enefermedades por medio de el tacto.

Signos vitales

Los signos vitales lla- mados también signos cardinales reflejan el estado fisiológico del cuerpo y alteraciones de las funciones norma- les del organismo

Consepto y valores normales de los signos vitales.

FC:numeros de veses que el coraon se contrae.VN: 60-100.

FR:Numero de veses que respiramos.VN:12-18.

PA:Fuerza que ejerse la sangre contra las paredes arteriales. 120-129 sistole,80-84 diastole.

Pulso:onda pulsatil que genera cada ves que la sangre golpea las paredes arteriales.VN:60-100.

Temperatura:parametro vital que indica el equilibrio de la producion de calor de el cuerpo.VN:36-37.5 C.

Lavado de manos

Es la limpieza adecuada de manos para eliminar bacterias, virus y hongos

Tecnica segun la(OMS)

1Moja las manos con agua.

2.Aplica suficiente jabón para cubrir toda la superficie de la mano.

3.Frótate las palmas de las manos entre sí.

4.Frótate la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda con los dedos entrelazados y viceversa.

5.Frótate las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados.

6.Frótate el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta manteniendo unidos los dedos.

7.Rodea el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha frotándolo con un movimiento de rotación y viceversa.

8.Frótate la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda haciendo un movimiento de rotación y viceversa.

9.Enjuágate las manos.

10.Sécalas con una toalla de papel desechable.

11.Usa la toalla de papel desechable para cerrar la llave de agua.

Momentos del lavado de manos

Momentos de la higiene de manos es una metodología que facilita el conocimiento y aplicación de las actividades.

Con el objetivo de prevenir la transmisión de microorganismos por medio de las manos

se vivide el 5 momentos y estos son.

1.Antes de tocar al paciente.

2.Antes de realizar una tarea limpia / aséptica.

3.Después del riesgo de exposición a líquidos corporales.

4.Después de tocar al paciente.

5.Después del contacto con el entorno del paciente.