



Nombre de alumno: Sayuri Azucena Salinas Aguilar

Nombre del profesor: José Mauricio Padilla Gómez

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Ecología

Grado: 4

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 2de noviembre de 2024

Parvovirus



El parvovirus canino o parvovirus, de manera coloquial también llamada “La Parvo”, es una enfermedad infecciosa, de tipo vírica, grave y potencialmente letal.


La mayoría de los casos se presentan en cachorros de 5 meses a 2 años de edad.

Los perros mayores de 2 años que no han sido vacunados y están expuestos al virus pueden presentar la enfermedad de forma subclínica



El parvovirus canino se distribuye en lugares públicos, parques, refugios y perreras, donde se puede encontrar en las heces o vómito de los perros infectados. El virus es adaptable al medio ambiente y puede sobrevivir en el excremento por hasta dos semanas, y en el ambiente por meses

El parvovirus canino es un virus ADN que ataca a los perros y otros cánidos, principalmente en el tracto gastrointestinal.



CAUSA. La enfermedad es causada por un virus, el Parvovirus canino de tipo dos o PVC-2 del cual existen algunas variantes hoy en día.

- Diarrea, que puede ser hemorrágica y maloliente
- Vómitos
- Deshidratación
- Fiebre
- Anorexia
- Ataxia, incoordinación
- Problemas cardiacos
- Dolor a la palpación de abdomen
- Pérdida de peso

Signos clínicos

- Decaimiento y depresión
- Anorexia (pérdida de apetito)
- Fiebre (40°C y 41°C)
- Vómitos (espumosos)
- Diarrea con sangre
- Deshidratación



LESIONES

- Pared intestinal engrosada y descolorida
- Contenido intestinal acuoso, mucoso o hemorrágico
- Edema y congestión de los nódulos linfáticos abdominales y torácicos
- Atrofia tímica
- Estrías pálidas en el miocardio


- Ensayos de reacción en cadena de la polimerasa (PCR)
- Test rápido de parvovirus canino
- Prueba SNAP Parvo



Para diagnosticar el parvovirus canino, se puede realizar una prueba de laboratorio o un test rápido:

Coronavirus canino, Salmonelosis, Campylobacteriosis, Giardiasis, Moquillo canino, Hepatitis infecciosa canina.

No existe un tratamiento específico para el parvovirus canino,



La mejor manera de prevenir el parvovirus canino es vacunar al cachorro, siguiendo el protocolo de vacunación recomendado por el veterinario

<https://urgenciasveterinarias.com/parvovirus-canino-sintomas-diagnostico-tratamiento/#:~:text=El%20parvovirus%20canino%20o%20parvovirosis,forma%20inmediata%20al%20centro%20veterinario.>

[https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/666c0ec1-b373-4321-a2e9-7253f8e5cb9f/content#:~:text=Epidemiol%C3%B3gicamente%20se%20ha%20comprobado%20que,tasa%20de%20reinfecci%C3%B3n%20\(23\).&text=En%20Latinoam%C3%A9rica%20las%20circunstancias%20son,nunca%20reportada\)%20\(24\).&text=Sin%20embargo%2C%20cabe%20aclarar%20que,El%20Salvador%2C%20Honduras%2C%20Paraguay.](https://repositorio.utp.edu.co/server/api/core/bitstreams/666c0ec1-b373-4321-a2e9-7253f8e5cb9f/content#:~:text=Epidemiol%C3%B3gicamente%20se%20ha%20comprobado%20que,tasa%20de%20reinfecci%C3%B3n%20(23).&text=En%20Latinoam%C3%A9rica%20las%20circunstancias%20son,nunca%20reportada)%20(24).&text=Sin%20embargo%2C%20cabe%20aclarar%20que,El%20Salvador%2C%20Honduras%2C%20Paraguay.)

<https://www.boehringer-ingelheim.com/sa/salud-animal/animales-de-compania/animales-de-compania/la-parvovirosis-canina-una-enfermedad-que#:~:text=Transmisi%C3%B3n%20y%20s%C3%ADntomas,Medula%20%C3%B3sea>

<https://www.fmvz.unam.mx/fmvz/cienciavet/revistas/CVvol4/CVv4c5.pdf>

<https://www2.ar.zoetis.com/productos-y-soluciones/caninos/parvovirosis#:~:text=en%20el%20entorno.-,CAUSA,los%20s%C3%ADntomas%20de%20la%20enfermedad.>

<https://www.msdrvmanual.com/es/aparato-digestivo/enfermedades-del-est%C3%B3mago-y-de-los-intestinos-en-peque%C3%B1os-animales/parvovirus-canino#:~:text=Lesiones,estr%C3%ADas%20p%C3%A1lidas%20en%20el%20miocardio.>

<https://dspace.ups.edu.ec/bitstream/123456789/17627/1/UPS-CT008378.pdf>

<https://www.ciudaddelosangeles.com/blog/como-evitar-parvovirus-canina/>