Nombre de alumno: Mario Antonio Ventura López

Nombre del profesor: Gonzalo rodriguez rodriguez

Nombre del trabajo: mapa conceptual

Materia: fisiología de la reproduccion

Grado: 4

Grupo: b

Nivel de vida y salud

se

divide

en

puerperio

es

La etapa de la hembra después del parto, donde suceden cambios fisiológicos .

puede

Decirse que tiene una duración de 40 días aunque esto puede extenderse por meses incluso por años

en

Este periodo retroceden los cambios que se produjeron en el embarazo

Etapas del puerperio.

son

Puerperio inmediato

abarca las primeras 24 horas después de parto.

Puerperio mediato

se extiende desde el segundo al décimo día..

Puerperio alejado

concluye en torno a los 40-45 de postparto.

Retención de la placenta.

se

define como retención de las membranas fetales o retención placentaria en vacas a la falta de su expulsión dentro de las 12 a 24 horas después del parto. De forma normal, dicho proceso ocurre entre 3 y 8 horas posteriores.

si

no se trata, la placenta retenida puede causar una infección grave o una pérdida de sangre que pone en riesgo la vida

para

tratarlo

se

Retira manualmente la placenta retenida. Muchos veterinarios utilizan antibióticos locales o sistémicos

La Madre y su cuidado después del Parto

hay

unos cuidados esenciales en la hembra después del parto, para tener una buena salud

como

Proporcionar les una dieta adecuada

Tenerla en un lugar con buena sanidad

Inspeccionar glándulas mamarias

Inspeccionar si no sufrió un desgarre

Debe beber una gran cantidad de agua

Cuidados del Recién Nacido Durante la Primera Fases después del parto.

son

Inspeccionar por alguna lesión

Tomar constantes fisiológicas

Que ingiera calostro

Limpiar cordón umbilical

Limpiar moco de las vías aéreas para que pueda respirar