



Nombre de alumno: Mariana Aguilar Jiménez

Nombre del profesor:
Mvz. Mauricio Padilla

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Zootécnica de Equinos

Grado: 7°

Grupo: B

Comitán de Domínguez Chiapas a 28 de octubre 2024

CÓLICO EQUINO

- Es un dolor abdominal intenso que puede ser causado por problemas en el sistema digestivo, a causa de alimentos que no circulan correctamente por el intestino, ingestión excesiva de alimentos fermentables, como granos, hierba succulenta, etc.


CÓLICO TIMPÁNICO

Cuando el caballo tiene grandes cantidades de gas que no pueden salir en el tubo digestivo



CÓLICO DE IMPACTACIÓN

Cuando los alimentos no circulan correctamente por el intestino



CÓLICO ESPASMÓDICO

Es un cólico intermitente que se trata con medicamentos, a causa de parásitos, estrés, temperamento del caballo



CÓLICO POR TORSIÓN DEL INTESTINO

Es el más grave, se produce cuando el intestino gira sobre sí mismo o queda atrapado en otra parte del intestino



CÓLICO POR INTUSUSUSCEPCIÓN

Cuando el intestino se pliega sobre sí mismo lo que puede provocar la muerte de tejido por falta de riego sanguíneo.



CÓLICO POR DISTENSIÓN DEL ESTÓMAGO

Cuando el caballo come grandes cantidades de comida en una vez. el caballo tiene un estómago pequeño, por lo que es susceptible a la distensión



Sinónimos:

- *Dolor abdominal equino*
- *Cólico de caballo*

Epidemiología y distribución:

- *Afecta al 4-10% de la población equina*
- *Puede ocurrir en cualquier edad, raza o sexo*
- *Mayor incidencia en caballos de 2-5 años*
- *Distribución mundial*

Patogenia:

- *Causado por una combinación de factores que afectan la función intestinal*
- *Incluye:*
- *Obstrucción intestinal*
- *Inflamación*
- *Isquemia*
- *Alteraciones en la motilidad intestinal*

Etiología:

- *Causas primarias:*
- *Obstrucción intestinal por cuerpos extraños*
- *Intususcepción*
- *Vólvulo*
- *Enredos*
- *Causas secundarias:*
- *Infecciones bacterianas o virales*
- *Parasitosis*
- *Alteraciones dietéticas*
- *Estrés*

Signos clínicos:

- *Dolor abdominal*
- *Pateo*
- *Sudoración*
- *Taquicardia*
- *Taquipnea*
- *Diarrea o estreñimiento*

Prevención y profilaxis:

- *Mantenimiento de una dieta equilibrada*
- *Asegurar acceso a agua fresca*
- *Evitar cambios bruscos en la dieta*
- *Control de parasitosis*
- *Vacunación contra enfermedades infecciosas*