


LICENCIATURA EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA



**HUGO
MORA
CANO**

**7
CUATRIMESTRE**




**PROF. JOSE
MAURICIO
PADILLA**



UDS

Mi Universidad



CÓLICOS EQUINOS

CÓLICO ES TODO DOLOR ABDOMINAL QUE SUFRE EL CABALLO, PUEDE PRODUCIRSE NO SÓLO POR UN PROBLEMA DEL SISTEMA DIGESTIVO, SINO POR ALTERNACIONES EN EL APARATO URINARIO O REPRODUCTOR Y PUEDE AFECTAR A TODO TIPO DE CABALLOS, INDEPENDIEMENTE DEL TRABAJO QUE REALICEN, SU RAZA, LA EDAD Y EL SEXO.

SINTOMAS

- Revolcarse
- Rascar el suelo
- Tumbarse largos periodos de tiempo
- Levantarse y tumbarse continuamente
- Mirarse los flancos
- Levantar el labio superior
- Darse patadas en el abdomen
- Posición estirada
- Ausencia de heces durante un periodo mayor a 24h
- Pulso y respiración acelerados



TIPOS DE CÓLICOS

Existen una gran variedad de cólicos. Cada uno se define por la zona anatómica afectada dentro del tracto digestivo y por si es estrangulante o no, también se pueden clasificar por la causa que los provoca

DIAGNÓSTICO

- Frecuencia cardiaca (normal hasta 42 latidos por minuto)
- Frecuencia respiratoria (normal entre 16-24 respiraciones por minuto)
- Temperatura (normal hasta 38,2°C)
- Pulso digital en extremidades (valorar posible laminitis)
- Grado de hidratación (pliegue de la piel)
- Color de mucosas orales (nos da información sobre como se encuentra la mucosa intestinal)
- Motilidad intestinal.

- Cólico por impactación: Acumulación de arena, tierra, alimento u otro material.
- Cólico por gas y espasmódico: Éstos ocurren cuando se produce una acumulación de gases o líquidos en el sistema digestivo y crean presión.
- Enteritis: inflamación del intestino causada por virus, bacterias e infecciones.
- Intususcepción: el intestino se pliega sobre sí mismo.
- Distensión del estómago: sucede cuando come grandes cantidades de comida de una vez.
- Cólico por desplazamiento y torsión: el intestino se encuentra de forma libre en el abdomen y es relativamente fácil que se mueva de su sitio.

TRATAMIENTO

- Hacer cambios progresivos en la dieta del animal
- Alimentar al animal siempre en las mismas horas
- Acceso a agua limpia
- Mantener el comedero limpio y libre de polvo y moho
- Revisar la boca del animal y mantenerla en un buen estado
- El caballo debe salir a pasear todos los días
- Administrar una cantidad adecuada de forraje en la dieta (50% del total)
- En el caso de estar en paddock, intentar dar la comida y forraje en recipientes (no directamente sobre el suelo) para evitar la ingestión de arena
- Aplicar un programa eficaz de desparasitación

