

NOMBRE DE LA ALUMNA: JUDITH
GUADALUPE PEREZ MARTINEZ

NOMBRE DEL DOCENTE : MVZ. JOSE
MAURICIO PADILLA

MATERIA: ZOOTECNIA DE EQUINOS

PARCIAL: 3°

TEMA: CÓLICO EQUINO

CUATRIMESTRE: SÉPTIMO

LICENCIATURA:
VETERINARIA Y ZOOTECNIA

MEDICINA



El



CÓLICO EQUINO


¿QUE ES ?

El cólico es un término general que implica dolor abdominal y es una de las principales causas de muerte en caballos. Afecta más comúnmente al caballo entre los animales doméstico



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial más común del cólico equino es la enteritis-yeyunitis proximal. En casos graves, se debe considerar la ulceración gástrica, la gastritis, el cgcg gástrico y otros tumores gástricos.



EPIDEMIOLOGÍA

El cólico equino es un síndrome que se caracteriza por un dolor abdominal agudo y es una de las principales causas de muerte en caballos.



Causas cólicos en caballos

De entre las causas que existen para que un caballo se vea afectado por un cólico, destacamos las siguientes, que están especialmente relacionadas con su alimentación.

- Cambios bruscos en la alimentación. Cada vez que se realicen cambios en la dieta del caballo
- Alimento fermentado. Hay que ser vigilante con el tiempo de caducidad del alimento balanceado, debido a que puede estar fermentado.
- Parásitos. Sin duda, el exceso de parásitos puede ser uno de los detonantes de que el caballo pueda padecer cólicos.

TIPO DE CÓLICOS

- Timpánico. Se da ante la presencia de grandes cantidades de gas que no consiguen atravesar el tubo digestivo y salir del mismo. Suele seguirse un tratamiento con medicinas, aunque hay que destacar que puede llegar a ser necesaria una cirugía.
- Impactación. Se produce cuando los alimentos ingeridos por el caballo no circulan correctamente a través del intestino. El tratamiento está basado en medicinas o, incluso, en una intervención quirúrgica.
- Espasmódico. Este cólico es de tipo intermitente, es decir, está presente durante unos 20-30 minutos y desaparece, volviendo después a aparecer. Se trata con medicinas.
- Torsión del intestino. Es, sin duda, el caso más grave de los cólicos en caballos. Se da cuando algunos tramos del intestino llegan a retorcerse sobre sí mismos o quedan atrapados en otra zona intestinal. El tratamiento tiene que ser por cirugía.



CÓLICO EQUINO

SINTOMAS

Los caballos con dolor suave a moderado muestran los siguientes signos:

- Rascan con las extremidades anteriores en el suelo.

- Sudan.

- Se miran a los flancos.

- Se muestran intranquilos.

- Tienen falta de apetito.

- Permanecen tumbados en el suelo.

Los caballos con dolor severo:

- Rascan en el suelo de manera violenta.

- Sudan profusamente.

- Presentan temblores musculares.

- Se tumban y se levantan frecuentemente.

- Se revuelcan por el suelo o se tumban sobre su espalda.

- Tienen temperatura corporal anormal.

- Tienen aumentada la frecuencia respiratoria y cardiaca.

- Los ruidos intestinales son pocos o ausentes.

pruebas diagnósticas o tratamiento de las patologías de la cavidad oral.

Prevención del cólico

Dieta:

- Alimentar con dietas de buena calidad, evitando los cambios de dieta y en caso de realizar cambios en la alimentación estos deben hacerse de modo gradual.

- Administrar una dieta equilibrada en proteínas, energía, vitaminas y minerales. El uso de suplementos en la dieta puede alterar este balance por lo que deben administrarse con cuidado.



Manejo:

- Proporcionar la oportunidad de realizar un ejercicio regular, pues los caballos confinados


en un box tienen más riesgo de cólico.

- Mantener un buen control del estado de la dentadura, pues un limado regular de los dientes ayuda a una correcta masticación.

TRATAMIENTO CON MEDICAMENTOS

Para tratar el cólico en caballos, se pueden utilizar medicamentos como:

Torbugesic: Alivia el dolor abdominal asociado con cólico espasmódico y timpánico, torsión, impactación, e intususcepción.



Metazone: Antiinflamatorio natural que alivia el dolor en caballos.

Flunixin meglumina: Analgésico no narcótico y no esteroideo con propiedades antiinflamatorias y antipiréticas.

Buscapina Compositum: Tratamiento para el cólico espasmódico y obstrucción esofágica.

PROCESO DE TRATAMIENTO

examen general de tu caballo para evaluar parámetros como:

- - Frecuencia cardíaca
- - Frecuencia respiratoria
- - Temperatura rectal
- - Temperatura de sus extremidades
- - Coloración de las mucosas
- - Nivel de deshidratación
- - Sonidos intestinales

• Puede también proceder a un examen rectal para determinar la posición, el tamaño y la movilidad de los órganos. Así podrá determinar la presencia de un tapón, una acumulación de gases o una zona especialmente dolorosa.



Pruebas de laboratorios



Ecografía abdominal rápida localizada (FLASH)

Puede ser más precisa que la palpación rectal para detectar lesiones que requieran cirugía.

Endoscopio

Permite examinar el esófago, estómago y duodeno proximal, para detectar obstrucciones, ulceraciones y divertículos.

Sonda gástrica

Puede ayudar a liberar gas o líquido que podría romper el estómago.

Análisis de la composición sanguínea

La proteína y los glóbulos blancos pueden indicar la extensión del daño intestinal.

Hallazgos en una necropsia



Impactaciones gástricas o cecales, Rotura gástrica.

Otros hallazgos que se pueden encontrar en un caballo con cólico son:

Alteraciones en la piel y el pelaje

Presencia de sangre, parásitos, moco, arena, tierra o elementos extraños en las heces

Anorexia

Frecuencia respiratoria variable

Coloración de las mucosas que puede variar de rojo brillante a rojo oscuro

COLICOS EN EQUINOS



www.StallionMexSearch.com

