

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del Alumno: Erick Peñaloza Martínez

Nombre del tema: Súper Nota

Parcial: 3º

Nombre de la Materia: Pequeñas Especies

Nombre del profesor: Samantha Guillen Pohlenz


Nombre de la Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia

Cuatrimestre: 7º

CICLO ESTRAL DE LA GATA

Ciclo estral

Las fases son similares a las de las perras aunque tienen sus diferencias durante la estación reproductiva presenta una sucesión de fases foliculares sin fases lúteas, siempre que no ocurra la ovulación, si ocurre la ovulación y se produce la fertilización, comienza la gestación; si la fertilización fracasa se inicia una fase lútea que en la gata se denomina pseudogestación. Luego de cada fase folicular, gestación o pseudogestación, la hembra entra en un período corto de reposo sexual llamado interestro antes de retomar nuevamente la actividad sexual o bien entra en el anestro si ha finalizado la temporada reproductiva.



Proestro: El proestro tiene una duración media de 48 horas con una variación de 12 a 72 horas.

Estro: El estro tiene una duración media de 7 días, pero puede variar de 1 a 21 días.

Interestro: Dura aproximadamente 7 días con un rango de 2-19 días. **Diestro:** Aquellas gatas que ovularon y no quedaron preñadas, duración de 35-45 días.

Anestro: Es el período de quietud reproductiva, que se produce por la disminución del fotoperíodo en el otoño-invierno.

CICLO ESTRAL DE LA PERRA

Primer celo en perras

La llegada del primer celo es un indicador de la aparición de la madurez sexual y puede variar enormemente según el tamaño de la perra, de forma general, podemos observar que se presenta en los siguientes meses de vida:

Perros pequeños: entre los 6 y 12 meses

Perros medianos y grandes: entre los 7 y 13 meses

4 meses y medio (variable)	Duración media 9 días	Duración media 9 días	2-3 meses si no preñez
ANESTRO	PROESTRO	ESTRO	DIESTRO
No acepta la monta	Acepta la monta		No acepta la monta
No atracción	Atracción del macho		No atracción

Proestro: Esta etapa puede ser algo complicada de detectar en ocasiones, especialmente en aquellas perras que producen un sangrado poco abundante. Suele durar entre 3 y 17 días y en esta etapa la perra no es fértil.

Estro: La etapa fértil, también conocida como estro, se produce después del proestro, momento en el que la perra está receptiva para la monta. Tiene una duración similar a la etapa anterior, de entre 3 y 17 días aproximadamente.

Diestro: La duración del diestro puede variar entre los 60 y los 100 días. Eso dependerá directamente de si ha existido o no fecundación, en cuyo caso se producirá la gestación, el parto y la lactancia.

Anestro: En el caso de las perras preñadas, el diestro finaliza con el parto, dando paso al anestro, el período de inactividad sexual.

