

NOMBRE DE ALUMNO: CARLOS FABRITZIO GARCIA ARIAS

NOMBRE DEL PROFESOR: SAMANTHA GUILLEN POHLENZ



NOMBRE DEL TRABAJO: SUPER NOTA

MATERIA: ZOOTECNIA DE PEQUEÑAS ESPECIES

GRADO: 7

GRUPO: B

Ciclo estral de la Perra


El ciclo estral de una perra, también conocido como celo, es un proceso hormonal cíclico que consiste en cuatro fases: proestro, estro, diestro y anestro:

Estro:

El periodo de apareamiento, que dura de 5 a 10 días. El flujo sanguíneo disminuye y se detiene. La ovulación se produce durante este tiempo.

Proestro:

- El inicio del celo, que dura de 7 a 10 días. La vulva se hincha y hay flujo sanguíneo.



Diestro:

El periodo de 10 a 140 días después del celo, cuando la perra está gestante o en una fase de descanso.

Anestro:

El periodo de descanso entre el diestro y el siguiente ciclo de celo.

Ciclo estral de la Gata

Estro

- En ausencia de macho, dura de 10 a 14 días. En presencia de un macho, dura de 4 a 7 días.

Metaestro

Es la fase de inactividad sexual que se da después del celo si no hay apareamiento.

Proestro

- Dura aproximadamente 24 horas, pero puede durar hasta 4 días. Es el momento en que la actividad folicular se reinicia y la gata se prepara para el coito y la preñez.

El ciclo estral de las gatas es estacional y poliéstrico, lo que significa que tienen ciclos repetidos durante la estación reproductiva. La actividad reproductiva de las gatas está determinada por la cantidad de luz solar.



Diestro

Se da si la gata ha sido cubierta pero no ha quedado preñada. Dura aproximadamente 45 días

Anestro

Es la etapa de inactividad sexual hasta la siguiente estación reproductiva.