



NOMBRE DEL DOCENTE: José Mauricio Padilla Gómez

NOMBRE DE LA ALUMNA: Andrea Guadalupe Gómez Moreno

NOMBRE DE LA MATERIA: Zootecnia de ovinos y caprinos

NOMBRE DEL TRABAJO: Cuadro sinóptico

CUATRIMESTRE: 7

GRUPO: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de octubre de 2024

Manejo Reproductivo

Detección de calores

La adecuada detección de borregos es muy difícil de detectar a simple vista ya que sus manifestaciones externas son poco apreciables.

Métodos Para Preparar Animales reproductores

Vasectomización
Desviación del pene
Aplicación de inyecciones de testotestona

Número de hembras por Semental

Usar 4 sementales para 100 hembras en monta dividida es un semental por cada 40 hembras y 100 hembras por 1 semental.

Estimometría

Medida de semental. Expresión en mayor medida su potencial reproductivo en la secreción escrotal que se relaciona con el número de lana.

Otros aspectos reproductivos

Selección de animales reproductores.

Cuando los animales alcanzan entre 4 a 6 años son más fértiles, prolíficos y con mayor habilidad.

Estacionalidad

Existe una época de anestro estacional.

Foto Período

Es mayor conforme aumenta la latitud siendo muy acentuado entre los 40° y 60° de latitud y mínimo de los 0° a los 20°.

Anestro Postparto

Se ve afectado por factores ambientales, genéticos, metabólicos y fisiológicos.

Abarcando aspectos como:

Época de reproducción, nivel nutricional, tiempo de amantamiento y tiempo de involución uterina.

Tasa de desarrollo folicular, concentración de gonadotropinas en la h. Pit. Ant. y en la Penfena.

Leche y lactancia

Afecta la duración del anestro postparto así como las ovejas que entrarán en celo cordado.

Características Reproductivas de la hembra.

Peso de los corderos al nacer

Peso Promedio de corderos

en la raza Blackbell: es de 2.1 a 3.2 kg

Pelibuey es de 2.8 y 2.2 kg en Partos dobles

Los borregos machos son generalmente del 5 al 12% más pesados que las hembras.

Mortalidad de los corderos

Índice de mortalidad

Corderos en lactancia es de 21.9 a 48.5%. Para blackbell y 11.21%, Pelibuey

Principales causas de mortalidad

20-30%: ayuno y exposición
30-40%: abortos y mortalidad
5-10%: defectos congénitos
15-20%: enfermedades infecciosas

Haijar

Cuando la propia cría ha muerto

Se le saca la piel y con esta se cubre la cría que se quiere ahijar

Flotar la cría con los líquidos del parto y con las membranas de la madre adoptiva

Enjaular a las ovejas y a la cría juntas hasta que la primera acepte su nueva cría

Introducir en un local aislado a la nodriza y al cordero huérfano y posteriormente hacer entrar en el mismo al perro pastor. El mismo instante de la oveja la inclina a proteger al recién nacido.