

NOMBRE DE ALUMNO: CARLOS FABRITZIO GARCIA ARIAS

NOMBRE DEL PROFESOR: JOSE MAURICIO PADILLA GOMEZ



NOMBRE DEL TRABAJO: SUPER NOTA

MATERIA: ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS

GRADO: 7

GRUPO: B

Timpanismos en ovinos

Síntomas

- Disminución del consumo de alimento
- Apariencia de angustia y dolor
- Distensión del abdomen del lado izquierdo
- Movimientos ruminales disminuidos (fuerza y frecuencia)
- Problemas para moverse (caminar, acostarse)
- Defecación y micción frecuentes

tratamiento

Sondas nasogástricas, trocar o fístula ruminal o desestabilizadores de la espuma.

Tipos de timpanismo

- Timpanismo espumoso o primario.
- Timpanismo gaseoso o secundario

El timpanismo es una alteración digestiva, caracterizada por una sobredistensión del rumen-retículo (2 de los 4 compartimentos del estómago del rumiante y donde se concentra la mayor parte del proceso digestivo) con gases de la fermentación microbiana, que por diferentes causas el rumiante no es capaz de expulsar.

TIMPANISMO



Prevención

- Evitar el consumo de forrajes frescos.
- Evitar cambios drásticos en la dieta.
- Mantener los corrales o alojamientos limpios

Causas

Consumo de forrajes, Consumo de concentrados, La ingestión de grandes cantidades de forraje fresco proveniente de leguminosas como la alfalfa o el trébol es una de las causas más frecuentes de timpanismo, sobre todo cuando son consumidas en la etapa de crecimiento previo a la floración, aunque puede ocurrir en cualquier momento.