NOMBRE DEL ALUMNO: JUDITH GUADALUPE PÉREZ MARTÍNEZ
NOMBRE DEL DOCENTE:MVZ. JOSÉ MAURICIO PADILLA
TEMA: REPRODUCCIÓN
MATERIA: ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS
LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA
PARCIAL:2°
CUATRIMESTRE:7°

REPRODUCCIÓN

Características reproductivas De la hembra

La

Pubertad es el momento en que la reproducción se torna posible

Se

Caracteriza por la primera manifestación de la hembra de un período receptivo al macho denominado estro.

Como

Los factores que influyen sobre el estro incluyen la raza.

- Nivel de nutrición
- Incidencia de enfermedades
- Y
  - El
    - Promedio del peso corporal es de 21 a 23.3 kg al primer estro observado.
- Presencia del macho
- Desarrollo Físio general

Cómo

La longitud del ciclo estral es aproximadamente 17 días.

Con

una presentación de celos que es de aproximadamente 90% de hembras en el hato.

La

gestación es el período transcurrido desde la fecundación hasta el parto, se indica que la duración de la gestación la cual fluctúa es de 137 a 158 días.

Cómo

diagnóstico de gestación

El

el diagnóstico temprano y con certeza de la gestación tiene una elevada importancia económica en cualquier especie.

Y

El Parto debe considerarse como un evento que no represente.

Otros aspectos reproductivos

La

Selección de animales reproductores nos dice que las ovejas adultas son superiores reproductivamente que las jóvenes.

Cómo

Un dato frecuente Se sabe que los animales con testículos grandes producen mayor cantidad de espermatozoides.

La

La longevidad depende de las condiciones de explotación y principalmente de la alimentación

Que

lo que influye directamente a través del efecto que ejerce sobre el mayor o menor desgaste de los dientes el tipo de alimento consumido.

En

La estacionalidad existe una serie de factores que influirían en el inicio y duración en la estación reproductiva de los ovinos

Como

- Fotoperiodo
  - O
    - Variación de la luz
- Nutrición
- Factores Exteroceptivos
  - La
    - Presencia del macho Y raza.
- Factores climáticos
  - Como
    - La temperatura
    - La Humedad

Lactancia

Es

Definido como el tiempo transcurrido entre el parto (desde el nacimiento) y el destete.

El

calostro es la primera secreción de la glándula mamaria y dura aproximadamente de 4 a 5 días su producción

Se

Transforma en posteriormente en leche.

El

cordero debe obtener una cantidad adecuada de calostro de la oveja lo más rápidamente posible (no más de 6 h después del nacimiento).

El

período de producción láctea de la oveja dura alrededor de 5 meses con un máximo de producción hasta sus 6-8 primeras semanas descendiendo paulatinamente hasta anularse.

Los

Factores que afectan a la lactancia, son los factores externos

Cómo

La alimentación

Ya que

Está puede hacer variar el rendimiento y la composición de la leche.

Anestro posparto

Es

Afectado por una serie de factores ambientales

Como

- Geneticos
- Metabólicos
  - También abarca algunos aspectos
  - Cómo
    - La época de reproducción
    - Nivel Nutricional
    - Tiempo de Amamantenimiento
      - La
        - Primera ovulación postparto en borregas que paren en la estación reproductiva ocurre a los 20 días y no está asociada a la presentación del estro.
        - La
          - Producción de leche
          - Y
            - afectan la duración del anestro postparto; así como las ovejas que criaron un solo cordero.
          - La lactancia
    - Desarrollo folicular
    - Involución Uterina
      - Se
        - Presenta de 25-30 días Pospar to.
- Fisiológicos

Peso de los corderos al nacer

Cómo

medida que el número de crías aumenta, hay una disminución en el peso al nacer de cada cordero

Los

Borregos machos son generalmente del 5 al 12% más pesados que las hembras.

Cómo

También el Peso al nacer de los corderos está fuertemente relacionado con el peso de la oveja al momento del empadre y la alimentación de la oveja en el último tercio de la preñez.

Los

Mor tinatos

Se

Refiere que un cordero ha nacido muerto y el aborto describe un parto antes de que el cordero esté listo, y en un momento en el cual no tiene la capacidad de sobrevivir fuera de la oveja.

Las

Causas puedes llegar hacer por

- Estrés
- Alimentación Inadecuada
- Enfermedades

Mortalidad de los corderos

Se

Dan a los 7 días de edad es el lapso más crítico pues ocurre la mayoría de las perdidas por corderos muertos

El

índice de mortalidad de corderos durante la lactación (hasta 17 semanas) es de 21.9 a 45.8% para Blackbelly y 11.21% para Pelibuey.

Existen

factores que contribuyen a estas pérdidas, el vigor del cordero, el número de crías, comportamiento maternal, producción de leche y exposición a las enfermedades

Las

Principales causas de mortalidad se dan

Por

20-30 % Ayuno y exposición
- 30-40 % Abortos y mortinatos
- 5 -1 O % Defectos congénitos
- 15-20 % Enfermedades infecciosas

Y

El porcentaje de mortalidad en corderos

Son

0-7 días 81%
- 8-30 días 15%
- 30 días 4% (1, 5, 14, 16, 19, 31, 38, 46, 52, 56, 70).

BIBLIOGRAFÍA: ANTOLOGÍA UDS, ZOOTECNIA DE OVINOS Y CAPRINOS.2024