



Nombre del alumno: Rodrigo Adonai Thomas Velazquez

Nombre del profesor: MVZ. Mauricio Padilla

Nombre del trabajo: Mapa Conceptual

Materia: Zootecnia de Ovinos

Grado: 7°

Grupo: "B"

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de octubre de 2024.

REPRODUCCIÓN EN OVINOS

LA

GX

El período transcurrido desde la fecundación hasta el parto. Los datos indican una distribución normal para la duración de la gestación la cual fluctúa de 137 a 158 días La duración de la gestación en la raza Pelibuey tiene un promedio de 149 días y en la raza Blackbelly es aproximadamente de 150.2 días.

EL

MANEJO REPRODUCTIVO

En los sistemas donde se utilizan empadres con monta controlada, así como en programas de sincronización del esto, y de inseminación artificial, Empadre o época de monta es el evento básico de un programa de manejo reproductivo

LA

NUTRICIÓN

Los animales padezcan una escasez prolongada de comida, pueden verse afectados el inicio y duración en la estación reproductiva en un aumento en el número de ovulaciones silenciosas.

LA

INSEMINACIÓN ARTIFICIAL

ES un método de reproducción en el que se obtiene el semen del macho para introducirlo posteriormente en el aparato genital de la hembra por medio de unos instrumentos especiales.

LA

LACTANCIA

Se define como el tiempo transcurrido entre el parto (desde el nacimiento) y el destete de presencia de leche
Cordero debe obtener una cantidad adecuada de calostro de la oveja lo más rápidamente posible {no más de 6 h después del nacimiento}.

EL

CONTROL DE LA REPRODUCCION EN LA OVEJA

Las técnicas que utilizan la progesterona y la gonadotropina de suero de yegua preñada (PMSG) para inducir el estro fértil en la oveja sin importar su estado fisiológico (postparto, ovejas secas o en lactación) y en cualquier época del año ya no constituyen una innovación para los criadores