



Nombre del alumno: Juan Daniel Lopez Alcazar

Nombre del tema: Mapa conceptual, temas de la segunda unidad

Parcial: 2.-

Nombre de la Materia: “Zootecnia en Ovinos”

Nombre del profesor: Mvz. José Mauricio Padilla Gómez

Nombre de la Licenciatura: “Medicina veterinaria y zootecnia”

Cuatrimestre: 7.-

Lugar y Fecha de elaboración: 10/10/2024 Comitán de Domínguez Chiapas México

Características Productivas En Ovinos

Características Reproductivas En Hembras

Otros aspectos reproductivos

Mortalidad de los corderos

Si bien

Principalmente

- Pubertad presente a 6-10 meses de edad
- Primer estro observado se da con 21-23.3 kl

- Ciclo estral durante 17 días

- Gestación con duración de 137-158 días, comprendiendo desde la fecundación al parto.

Mientras tanto

La duración de la gestación en la raza Pelibuey tiene un promedio de 149 días y en la raza BlackBerry es aproximadamente de 150.2 días.

Podríamos

Realizar como primera instancia una selección de animales tomando en cuenta los siguientes parámetros.

Como

- Sementales con testículos de tamaño ideal producen mayor cantidad de espermatozoides.
- Eliminar animales con afecciones en los aplomos que impidan la monta.
- Eliminar hembras de aspecto cansado y dientes rotos, así como ubres dañadas.

- Eliminar animales con problemas como orquitis, hernias etc. Mejor si reemplazamos estos animales por animales jóvenes y con una correcta salud y condición adecuada.

Nutrición

Es afectada

Cuando un animal se encuentra, bajo la temporada de escasez de hambre llega a pasar por un sin fin de problemas por ejemplo el aspecto de su condición física.

Podríamos tomar como ejemplo la temperatura y humedad, se dice que tenemos a las ovejas por 5 días antes del parto, bajo una temperatura de 32°C podría provocar una menor fertilidad.

Ejemplo

- Presencia del macho
- Prolificidad
- Fertilidad

Lactancia

La producción lechera tiene una marcada influencia en el crecimiento y peso de la cría.

Por lo que se debe precisar un manejo adecuado del rebaño lactante.

Las

Ovejas con dos o más crías necesitan alimentos de muy buena calidad durante las primeras 6 semanas de lactancia.

El período de producción láctea de la oveja dura alrededor de 5 meses con un máximo de producción hasta sus 6-8 primeras semanas.

Factores externos que afectan:

- Alimentación
- Manejo general
- Manejos genéticos
- Números de lactancias etc.

Peso de los corderos al nacer

Generalmente

El peso promedio de corderos producto de parto sencillo en la raza Blackbelly es de 2.1 a 3.2

El promedio de peso de los corderos provenientes de partos simples es de 2.8 y 2.2 kg en partos dobles.

- Con un promedio general de 2.5 kg.

Ejemplo

- Los borregos machos son generalmente del 5 al 12% más pesados que las hembras.

Del nacimiento a los 7 días de edad es el lapso más crítico donde se da la mortalidad en corderos.

El índice de mortalidad de corderos durante la lactación es de 21.9 a 45.8% para la raza Blackbelly y 11.21% para la raza Pelibuey.

