



Nombre del alumno: Carolina García Abarca.

Nombre del tema: Utilización del DSM 5 y criterios de anormalidad.

Parcial: Primero.

Nombre de materia: Psicopatología.

Nombre del profesor: Guadalupe de Lourdes Abarca Figueroa.

Nombre de la Licenciatura: Licenciatura en Psicología.

Cuatrimestre: Séptimo.

Comitán de Domínguez a Noviembre del 2024.

# "UTILIZACIÓN DEL DSM 5 Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

## EL DSM 5

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la asociación americana de psiquiatría (American Psychiatric Association, APA).

Debe incluir una historia clínica (los factores sociales, psicológicos y biológicos).

Objetivo: Con el fin de elaborar un plan de tratamiento integral.

## TRASTORNO MENTAL

síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la regulación emocional o el comportamiento de un individuo que refleja una disfunción de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función mental.

El Dx de un TM servirá para un posible pronóstico, los planes de tratamiento y los posibles resultados del tratamiento en sus pacientes.

La necesidad de tratamiento es una decisión clínica compleja que debe tomar en consideración la gravedad del síntoma, su significado, el sufrimiento del paciente asociado con el síntoma, la discapacidad que implican dichos síntomas,

Los riesgos y los beneficios de los tratamientos disponibles y otros factores

## CRITERIOS DE SIGNIFICACIÓN CLÍNICA, CRITERIOS DIAGNÓSTICOS Y ELEMENTOS DESCRIPTIVOS

El criterio general de exigir que haya malestar significativo o discapacidad para establecer los umbrales del trastorno.

### CRITERIOS DE DIAGNOSTICO

Se indican los criterios específicos para definir la gravedad del trastorno (es decir, leve, moderado, grave, extremo),

### ELEMENTOS DESCRIPTIVOS

Con raciocinio bueno o aceptable; en un entorno controlado) y su curso (por ejemplo en remisión parcial, en remisión total, recidiva).

# "UTILIZACIÓN DEL DSM 5 Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

## SUBTIPOS Y ESPECIFICADORES

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders), es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la asociación americana de psiquiatría (American Psychiatric Association, APA).

Debe incluir una historia clínica (los factores sociales, psicológicos y biológicos).

Objetivo: Con el fin de elaborar un plan de tratamiento integral.

## SUBTIPOS Y ESPECIFICADORES

Se definen como subgrupos fenomenológicos dentro de un diagnóstico, mutuamente exclusivos y en conjunto exhaustivos, y están indicados con la instrucción "Especificar si" dentro del conjunto de criterios.

Los especificadores ofrecen la oportunidad de definir un subgrupo más homogéneo de individuos que sufren el trastorno y comparten determinadas características y aportan información relevante para el tratamiento del trastorno del individuo, como la especificación "con otra comorbilidad médica" en los trastornos del sueño y vigilia.

Los riesgos y los beneficios de los tratamientos disponibles y otros factores

## OTRAS AFECCIONES QUE PUEDEN SER OBJETO DE ATENCIÓN CLÍNICA

Se dedica otro capítulo aparte a los trastornos inducidos por medicamentos y otros efectos adversos de estos, que pueden ser evaluados y tratados por los clínicos que se ocupan de la salud mental

Incumplimiento terapéutico, simulación, comportamiento anti social del adulto, comportamiento antisocial en la niñez o adolescencia, capacidad intelectual límite, deterioro cognoscitivo relacionado con la edad, duelo, problema académico, de identidad, aculturación, biográfico.

# "UTILIZACIÓN DEL DSM 5 Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

## TIPOS DE DIAGNOSTICOS

diagnóstico principal: es la afección que se establece como causa fundamental del ingreso del paciente. debe citarse en primer lugar y el resto de trastornos son citados por orden de necesidad de atención y tratamiento.

El especificador "provisional" se puede utilizar cuando existe una fundada suposición de que al final se cumplirán todos los criterios de un trastorno, pero en el momento de establecer el diagnóstico no existe información suficiente para considerarlo definitivo.

## MÉTODO DE CODIFICACIÓN Y REGISTRO: HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

El sistema oficial de codificación que se usa en Estados Unidos en el momento de la publicación de esta guía es CIE-9-MC.

Los códigos CIE-9-MC y CIE-10-MC se han listado por un lado antecediendo el nombre del trastorno en la clasificación y por otro acompañando al conjunto de criterios de cada trastorno.

## USO DEL DSM 5 EN EL ÁMBITO FORENSE

Se utiliza como referencia en los juzgados/ tribunales y por los abogados para evaluar las consecuencias forenses de los trastornos mentales. el

DSM-5 ayuda a quien corresponda tomar decisiones legales a comprender las características relevantes de los trastornos mentales.

La aplicación del DSM-5 debe ir acompañada de la advertencia sobre los riesgos y las limitaciones de su utilización en cuestiones forenses.

No se recomienda que las personas sin formación clínica, médica y, en general, sin la formación adecuada, utilicen el DSM-5 para valorar la presencia de un trastorno mental.

# "UTILIZACIÓN DEL DSM 5 Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

## CONCEPTOS Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

1) Criterios estadísticos: Lo definen a partir de dos supuestos: el supuesto de frecuencia y el supuesto de continuidad.

2) Criterios clínicos tienen como punto de partida la evaluación del paciente y se basan en la delimitación de conjuntos de síntomas que se identificarían con trastornos o cuadros psicopatológicos.

3) Criterios sociales o interpersonales  
La definición de anormalidad es una cuestión de normativa social: determinar el carácter psicopatológico de una conducta, rasgo o actividad depende del consenso social en un momento y lugar dados.

4) Criterios subjetivos o intrapsíquicos:  
El mismo individuo es quien mejor puede dictaminar su situación o estado.

5) Criterios biológicos  
Los diferentes trastornos psicopatológicos son fundamentalmente expresión de alteraciones o disfunciones del funcionamiento de la estructura o del proceso biológico que los sustenta.

# "UTILIZACIÓN DEL DSM 5 Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

## CONCEPTOS Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

1) Criterios estadísticos: Lo definen a partir de dos supuestos: el supuesto de frecuencia y el supuesto de continuidad.

2) Criterios clínicos tienen como punto de partida la evaluación del paciente y se basan en la delimitación de conjuntos de síntomas que se identificarían con trastornos o cuadros psicopatológicos.

3) Criterios sociales o interpersonales  
La definición de anormalidad es una cuestión de normativa social:  
determinar el carácter psicopatológico de una conducta, rasgo o actividad depende del consenso social en un momento y lugar dados.

4) Criterios subjetivos o intrapsíquicos:  
El mismo individuo es quien mejor puede dictaminar su situación o estado.

5) Criterios biológicos  
Los diferentes trastornos psicopatológicos son fundamentalmente expresión de alteraciones o disfunciones del funcionamiento de la estructura o del proceso biológico que los sustenta.

# "UTILIZACIÓN DEL DSM 5 Y CRITERIOS DE ANORMALIDAD

## MODELOS TEÓRICOS EN PSICOPATOLOGÍA

## SISTEMAS DE CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES

**Modelo biológico**  
Este modelo parte de una concepción médica de la Psicopatología: en la base de las alteraciones psicopatológicas se encuentran anomalías biológicas

hay fuerzas internas e inconscientes que determinan la conducta; concretamente, conflictos psicológicos internos originan y mantienen el trastorno psicopatológico.

Cada persona tiene de forma innata un potencial de crecimiento y actualización que constituye el motor de su conducta. Cuando estas capacidades hacia la autorrealización y la autenticidad se ven bloqueadas o distorsionadas, entonces se produce la patología.

**Modelo conductual**  
El principio básico del enfoque conductual es que la conducta desequilibrada ha sido aprendida; en concreto, consistiría en hábitos desadaptativos condicionados (clásica o instrumentalmente) a ciertos estímulos.

**Modelo cognitivo**  
Se considera que los determinantes principales del comportamiento - normal o anormal son procesos cognitivos. La conducta desadaptada se puede estudiar y entender en términos de cómo percibimos y pensamos las personas con respecto al mundo, a otras personas y a nosotros mismos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publica periódicamente la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE), que recoge una clasificación de todas las enfermedades registradas en sus países integrantes.