



**Lic. Medicina veterinaria y
zootecnia**

7to cuatrimestre "A"

**Jorge Alfredo Pérez
Rodríguez**

**Zootecnia de ovinos y
caprinos**

**MVZ. Román Reyes
Velazquez Cancino**

**Tapachula chiapas a 02 de
noviembre del 2024.**

ALIMENTACION EN BORREGOS

Producción su nivel:

Para un borrego de crecimiento, se recomienda 2.5% a 3% del peso corporal en materia seca al día.

• y para una bórrego de 30 kg, sería $30 \text{ kg} \times 2.75$
(promedio) = 0.825 Kg MS/día .

Componentes del pasto pangola:

El pangola tiene un contenido promedio de 90% de MS, por lo tanto para obtener 0.825Kg de MS, se necesita $0.825 \text{ kg} / 0.9 = 0.917$ kg de pasto pangola al día.



El pasto pangola:

Es una hierba forrajera perenne originaria de Sudáfrica. Se cultiva para pastoreo de ganado en América, siendo apreciada por su resistencia a la sequía, su versatilidad en cuanto a los suelos y su rápido crecimiento.

Importancia:

La cantidad de pasto pangola que consume un borrego de 30kg depende de varios factores como la edad, raza, estado fisiológico y producción.



También se puede usar como pasto de corte e incluso los excedentes se pueden conservar en forma de ensilaje y heno.

Se utiliza principalmente en pastoreo rotacional con 25 días de descanso y puede soportar una carga animal de 3 unidades por hectárea.

**Bibliografía: Antología UDS
Diapositivas de clases.**

