



Mi Universidad

Súper nota

Nombre del Alumno: Nicole Penagos Armas

Nombre del tema : trastornos de ansiedad

Parcial :4

Nombre de la Materia: psicopatología

Nombre del profesor: Oscar Carreri

Nombre de la Licenciatura: psicología

Cuatrimestre: 7

TRASTORNO DE ANSIEDAD POR SEPARACIÓN

Características

Mirando o ansiedad excesiva e inapropiada a la separación de personas con las que siente un apego

Malestar excesivo y recurrente cuando vive una separación de hogar o de figuras de apego.

Preocupación excesiva y persistente por una posible pérdida de las figuras de apego o que sufran algún daño



Criterio de diagnóstico:

El miedo y ansiedad tiene una duración de al menos cuatro semanas en niños y adolescentes y seis meses o mas en personas adultas.

Su alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social , en áreas académicas o del funcionamiento.



Duración.

4 meses en niños y 6 meses o más en adultos

factores de riesgo:

Estrés en l la vida o pérdida que acusen la separación



MUDISMO SELECTIVO



Características

Fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que existe expectativa por hablar

La alteración interfiere en los logros educativos o laborales, o en la comunicación social.



Criterio diagnóstico

El fracaso para hablar no se puede atribuir a la falta de conocimiento o a la comodidad con el lenguaje hablado necesario en la situación social

alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación

duración

Como mínimo un mes (no limitada al primer mes de la escuela)

Factores de riesgo:

exposición

AGORAFOBIA

Características

1. Uso del transporte público
2. Estar en espacios abiertos
3. Estar en sitios cerrados
4. Hacer cola o estar en medio de una multitud.
5. Estar fuera de casa solo.

Criterios diagnósticos

- Las situaciones agorafóbicas casi siempre provocan miedo o ansiedad.
- Las situaciones agorafóbicas se evitan activamente, requieren la presencia de un acompañante o se resisten con miedo o ansiedad intensa.
- Miedo o la ansiedad es desproporcionado al peligro real que plantean las situaciones agorafóbicas y al contexto sociocultural.

Duración 6 meses o más

