



NOMBRE DEL ALUMNO

KARLA YURENI TOVILLA GARCIA

NOMBRE DEL PROFESOR

MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

MATERIA

ENFERMERIA CLINICA I

TEMA

SHOCK

CUATRIMESTRE Y GRUPO

4-A

FECHA DE ENTREGA

11/10/2024



SHOCK

DEFINICION

El shock un síndrome clínico asociado a múltiples procesos, cuyo denominador común es la existencia de una hipoperfusión tisular que ocasiona un déficit de oxígeno (O2) en diferentes órganos y sistemas, Este déficit de O2 conlleva un metabolismo celular anaerobio, con aumento de la producción de lactato y acidosis metabólica.

TIPOS

- Shock Hemorrágico
- Shock Hipovolémico no hemorrágico
- Shock cardiogénico
- Shock obstructivo extra cardiaco
- Shock Séptico
- Shock Anafiláctico
- Shock Neurogénico

FASES DEL SHOCK

- Fase de shock compensado
- Fase de shock descompensado
- Fase de shock irreversible



CLINICA DEL SHOCK

- Hipotensión arterial: Presión arterial media (PAM) < 60mmHg o presión arterial sistólica (TAS) < 90 mmHg o un descenso > 40 mmHg de sus cifras habituales. Se debe usar la PAM ya que es permite una valoración menos sujeta a errores que la PAS.
- Disfunción de órganos: oliguria, alteración del nivel de conciencia, dificultad respiratoria.
- Signos de mala perfusión tisular: frialdad, lívides cutáneas, relleno capilar enlentecido, acidosis metabólica.

CUIDADO DE ENFERMERIA

- Evaluar al paciente
- Mantener al paciente caliente
- Controlar la hemorragia
- Administrar oxígeno
- Controlar la respiraciones
- Administrar medicamentos
- Colocar al paciente en posición antishock



https://www.canva.com/design/DAGWTxNJAEM/HAepuF0_JHmZQqzZ3_E5qA/edit?utm_content=DAGWTxNJAEM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

CONCLUSIÓN

El shock corresponde a un estado de hipoxia celular y tisular resultado de una reducción en la entrega de oxígeno y un incremento en el consumo de oxígeno o a su utilización inadecuada.

El shock también es un cuadro clínico difícil de tratar por eso la mejor terapia es evitar que el paciente desencadene dicho estado patológico.

El médico debe poseer un amplio conocimiento sobre este tema debido a que muchas enfermedades pueden desencadenar un shock y el desempeño rápido.

Es importante manejar las enfermedades cardíacas y mantener al paciente en un estado compensado para evitar un cuadro clínico.

En conclusión el shock se considera como una condición de amenaza a la vida en la cual hay un suministro insuficiente de flujo de sangre en el cuerpo una medida terapéutica oportuna nos puede ayudar a salvar la vida al paciente también es nuestra responsabilidad conocer el shock en todas sus dimensiones.

- Colocar a la víctima en posición de shock
- Mantener a la persona cómoda y cálida
- Voltar la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión del cuello



BIBLIOGRAFÍA

ANTOLOGIA DE ENFERMERIA CLINICA I UDS 2024.PDF

<https://www.plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/3ff03ca47ec4537653b7c98e9c3ad7c9-LC-LEN401%20ENFERMERIA%20CLINICA%20I.pdf>