



NOMBRE DEL ALUMNO

KARLA YURENI TOVILLA GARCIA

NOMBRE DEL PROFESOR

MARIA DEL CARMEN LOPEZ SILBA

MATERIA

ENFERMERIA CLINICA I

TEMA

SHOCK

CUATRIMESTRE Y GRUPO

4-A

FECHA DE ENTREGA

11/10/2024



SHOCK

DEFINICION

El shock un síndrome clínico asociado a múltiples procesos, cuyo denominador común es la existencia de una hipoperfusión tisular que ocasiona un déficit de oxígeno (O₂) en diferentes órganos y sistemas, Este déficit de O₂ conlleva un metabolismo celular anaerobio, con aumento de la producción de lactato y acidosis metabólica.

TIPOS

- Shock Hemorrágico
- Shock Hipovolémico no hemorrágico
- Shock cardiogénico
- Shock obstructivo extra cardiaco
- Shock Séptico
- Shock Anafiláctico
- Shock Neurogénico

FASES DEL SHOCK

- Fase de shock compensado
- Fase de shock descompensado
- Fase de shock irreversible

CLINICA DEL SHOCK

- Hipotensión arterial: Presión arterial media (PAM) < 60 mmHg o presión arterial sistólica (TAS) < 90 mmHg o un descenso > 40 mmHg de sus cifras habituales. Se debe usar la PAM ya que es permite una valoración menos sujeta a errores que la PAS.
- Disfunción de órganos: oliguria, alteración del nivel de conciencia, dificultad respiratoria.
- Signos de mala perfusión tisular: frialdad, lívides cutáneas, relleno capilar enlentecido, acidosis metabólica.

TRATAMIENTO

- Soporte Respiratorio
- Soporte Circulatorio
- Reposición de la volemia

https://www.canva.com/design/DAGWTxNJAEM/HAEpuF0_JHmZQqzZ3_E5qA/edit?utm_content=DAGWTxNJAEM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutto

BIBLIOGRAFÍA

ANTOLOGIA DE ENFERMERIA CLINICA I UDS 2024.PDF

<https://www.plataformaeducativauds.com.mx/assets/docs/libro/LEN/3ff03ca47ec4537653b7c98e9c3ad7c9-LC-LEN401%20ENFERMERIA%20CLINICA%20I.pdf>